

5月の農薬

No. 2 - 1

平成21年5月1日

水稲箱処理剤の使用においては、MBI-D剤（ウイン、デラウス、アチーブ）いもち病耐性菌の発生拡大が懸念されますので、対策剤の使用をご指導してください。

水稲

葉いもちの予防は箱処理剤で・長期持続型いもち害虫
同時防除箱処理剤で本田での防除回数が削減できます。

農薬名 (処理時間)	規格	譲渡書	主な対象病虫害	使用方法・使用量等
ビームアドマイヤー粒剤 (移植前2日～移植当日)	1kg	-	葉イモチ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ	・箱当たり50gを均一に散布し、茎葉に付着した薬剤が落下する程度に灌水する。 ・各薬剤共、1kg入り1袋で苗箱20枚分の量となる。 ・軟弱徒長苗では葉害の恐れがあるので、使用を避ける。
ビームプリンス粒剤 (移植前3日～当日処理)	1kg	-	葉イモチ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ニカメイチュウ	・漏水田、砂質土壌、未熟堆肥多用田では使用を避ける。 ・薬剤を選定する場合は対象病虫害、本田での防除体系を考慮する。 ・移植後はすみやかに灌水状態にする。
Dr.オリゼダントツ箱粒剤 デジタルコラトップアクタラ箱粒剤 (移植前3日～当日処理)	1kg	-	葉イモチ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ	・漏水田、砂質土壌、未熟堆肥多用田では使用を避ける。 ・薬剤を選定する場合は対象病虫害、本田での防除体系を考慮する。 ・移植後はすみやかに灌水状態にする。
Dr.オリゼプリンス粒剤6 (緑化期～移植当日)	1kg	-	葉イモチ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ニカメイチュウ	・薬剤処理した苗は予備苗としない。 ・長期持続型いもち剤のブイゲットプリンス粒剤6、Dr.オリゼプリンス粒剤6、ジャッジ箱粒剤、Dr.オリゼスタークル箱粒剤、デジタルコラトップ箱粒剤を使用した場合でも、7月下旬以降の穂イモチの発生に十分留意して、その後の防除剤を散布する。 (8月上旬～中旬にかけて、1～2回の穂イモチ防除を実施する)
ブイゲットプリンス粒剤6 (移植前3日～当日処理)				
嵐プリンス箱粒剤6 (移植3日前～移植当日)	1kg	-	葉イモチ 紋枯病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ニカメイチュウ	
ジャッジ箱粒剤 (移植前3日～当日処理)	1kg	○	葉イモチ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	

イネミズゾウムシ対策

薬剤の種類は発生する害虫に応じて、使用するようにしましょう。

処理時期	農薬名	規格	譲渡書	処理量	主な対象害虫					
					イネミズ	イネドロ	イナゴ	メイチウ	ウンカ類	ツマグロ
本田期	シクロバック粒剤	60g×10	-	60g×10/10a	○	○	○	-	-	-
	トレボン粒剤	2kg	-	2kg/10a	○	○	○	-	○	○

一 葉害が出る恐れがあるので、次の事項に注意すること

- 軟弱徒長苗には使用を避ける。
- 本田が砂質土壌及び、漏水の大きいところでは使用しない。
- 茎葉に付着した薬剤は払い落とす。(茎葉がぬれている時は、露を払い落してから処理する)
- 移植後はすみやかに灌水する。また、箱処理剤を使用した苗は予備苗としない。

水稲除草剤

各薬剤の使用時期を誤らないようにご指導ください。

農薬名	規格	譲渡書	主な対象雑草	使用方法・10a当り薬量
アゼナ対策可 ソルネット1キロ粒剤 マーシエット1キロ粒剤 (移植直後～ノビエ1葉期)	1kg	-	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイカ ヘラオモダカ ミズガヤツリ	・1kg/10aを均一に散布する。 ・砂質土壌や漏水の大きな水田(2cm/日以上)では使用を避ける。 ・3～5cmの湛水状態で使用し、3～4日間は止水する。
アゼナ対策可 ベクサー1キロ粒剤 (移植直後～ノビエ発生始期)	1kg	-	水田一年生雑草 マツバイ	・極端な浅植え水田では使用を避ける。 ・いずれの薬剤も、初期の抵抗性アゼナ類に対し効果が高い。
アゼナ対策可 エリジャン乳剤 (移植直後～ノビエ1葉期)	500ml	-	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイカ ヘラオモダカ	・300ml/10aを均一に散布する。 ・砂質土壌や漏れの大きな水田(3cm/日以上)では使用を避ける。 ・4日間は止水する。
※ ショキニーフロアブル (移植直後～ノビエ1葉期)	500ml	-	水田一年生雑草 マツバイ・ホタルイ ミズガヤツリ	・500ml/10aを均一に拡散させるため、幅が20m以上のほ場では畦畔からと、ほ場内から散布を行う。
※ ピラクロンフロアブル (移植直後～ノビエ1.5葉期)	500ml	-	水田一年生雑草	・3～5cmの湛水状態で使用し、4日間は止水する。

農薬名 (散布時期)	規格	譲渡書	主な対象雑草	使用方法・10a当り薬量
※ バッチリジャンボ (移植直後～ノビエ2.5葉期)	10パック (400g)	-	水田一年生雑草 マツバイ・ホタルイ ミズガヤツリ・ウリカワ ヘラオモダカ・ヒルムシロ セリ・アオミドロ 藻類による表層はく離	・10パック/10aを概ね均一に投げ込む。 ・藻や浮き草が多発しているほ場では、拡散が不十分となり、効果が低下するので使用しない。
※ ホームランキングジャンボ (移植1日後～ノビエ2.5葉期)	10パック (500g)	-		
※ シリウスターボジャンボ (移植後5日～ノビエ2.5葉期)	10パック (300g)	-		
※ キチット1キロ粒剤 (移植直後～ノビエ2.5葉期)	1kg	-	水田一年生雑草 マツバイ・ホタルイ ミズガヤツリ・ウリカワ ヘラオモダカ・ヒルムシロ セリ・アオミドロ 藻類による表層はく離	・1kg/10aを均一に散布する。 ・軟弱苗、極端な浅植え、浮き苗の多いほ場では使用を避ける。 ・抵抗性アゼナ類にはいずれかの薬剤を中心に使用する。
※ シリウスいぶき1キロ粒剤 (移植3日後～ノビエ2.5葉期)				
※ シリウスターボ1キロ粒剤 (移植3日後～ノビエ2.5葉期)				
※ スパークスター1キロ粒剤 (移植後5日～ノビエ2.5葉期)				
※ バッチリ1キロ粒剤75 (移植直後～ノビエ2.5葉期)				
※ ホームランキング1キロ粒剤75 ボス1キロ粒剤 (移植後5日～ノビエ2.5葉期)				
※ イノーバDX1キロ粒剤75 (移植直後～ノビエ2.5葉期)				
※ テラガード1キロ粒剤75 (移植後5日～ノビエ2.5葉期)				
※ パンチャー1キロ粒剤 (移植後5日～ノビエ2.5葉期)				
※ ホームランキングフロアブル (移植直後～ノビエ2.5葉期)				
※ トレディワイド1キロ粒剤 (移植後5日～ノビエ3葉期)	1kg	-	水田一年生雑草 マツバイ・ホタルイ ミズガヤツリ・ウリカワ ヒルムシロ・セリ オモダカ・アオミドロ 藻類による表層はく離	・1kg/10aを均一に散布する。 ・いずれの薬剤もノビエ3葉期までの登録がありますが、他の雑草の生育を考慮し、ノビエ2.5葉期頃までの使用をご指導ください。
※ トップガンGT1キロ粒剤75 (移植直後～ノビエ3葉期)				
※ トップガンフロアブル (移植直後～ノビエ3葉期)	500ml	-	水田一年生雑草 マツバイ・ホタルイ ミズガヤツリ・ウリカワ ヒルムシロ・セリ アオミドロ 藻類による表層はく離	・砂質土壌、および、漏水田、軟弱苗、極端な浅植えや、根の露出したほ場での使用は避ける。 ・500ml/10aを畦畔より額縁散布する。

※太字の薬剤は抵抗性アゼナ類および、抵抗性ホタルイに高い効果があります。

ラ・フランス

(西洋なし)

アブラムシ・シンクイムシ類の重要な防除時期です。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病虫害	倍率 100ℓ 当り薬量	10a当り 散布量	備考
5月上旬 中旬 (落花一週間後)	モスピラン水溶剤	100g 250g	○	アブラムシ類	4,000倍 25g	400ℓ 100g	いずれか 加用し 散布する。
	マトリックフロアブル	500ml	-	ハマキムシ類	1,000倍 100ml	400ℓ 400ml	
	バイオマックスDF	500g	-		2,000倍 50g	400ℓ 200g	
	ダイアジノン水和剤34	500g 1kg	○		1,000倍 100g	400ℓ 400g	
	サイアノックス水和剤	500g 1kg	-	アブラムシ ハマキムシ ナシヒメシンクイ	3,000倍 33g	400ℓ 133g	いずれか
	ダースパンDF	167g	○		1,500倍 67g	400ℓ 268g	
	スプラサイド水和剤	500g	○	シンクイムシ類 カメムシ類	2,000倍 50g	400ℓ 200g	
	ベンレート水和剤	500g	-	胴枯病	1,500倍 67g	400ℓ 268g	
	トップジンM水和剤		-		4,000倍 25g	400ℓ 100g	
	サンリット水和剤	250g	-	赤うどんこ 星病	5,000倍 20ml	400ℓ 80ml	
インダーフロアブル	100ml	-	(赤黒輪 星紋 病)				



もっと近くに。

JA全農山形県本部 生産資材部

お問い合わせ・ご注文の電話番号
023-634-8157

ご注文の際のFAX番号
023-634-8182

農薬はJAマークの製品を!

先入れ先出しの励行を!

5月の農薬

No. 2 - 2

平成21年5月1日

農薬の適正使用、ポジティブリスト制度の周知、農薬の使用基準を遵守し、飛散防止対策に留意しながら防除されるようご指導ください。訪花昆虫を保護するため、殺虫剤使用制限に準じて、ご指導ください。

りんご

- ①落下後～6月上旬までは「さび果」や「生理落花」が発生しやすいので、薬剤の選定に注意する。
- ②摘果剤（マイクロデナボン）の使用については、使用時期、使用方法を誤まらないようにする。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
落花直後（5月中旬）	アンビルフロアブル	500ml	-	黒斑点落葉病	1,000倍 100ml	500ℓ 500ml	混用 いずれか
	サンリット水和剤	250g	-	星点落葉病	4,000倍 25g	500ℓ 125g	
	オーシャイン水和剤	100g 335g 500g	-	赤モニリア	3,000倍 33g	500ℓ 165g	
	トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-	黒斑点落葉病	500倍 200ml	500ℓ 1,000ml	地域の殺虫剤使用制限に準じて下さい。（訪花昆虫保護）
	スプラサイド水和剤	500g 667g	○	ギンモンハモグリガ	1,500倍 66g	500ℓ 333g	
	ダーズバンDF25	167g	○	アブラムシ類 ハマキムシ類	3,000倍 33g	500ℓ 167g	
	フェニックス顆粒水和剤	100g 125g 250g 500g	-	ハマキムシ類	4,000倍 25g	500ℓ 125g	
	バイオマックスDF	500g	-	ハマキムシ	2,000倍 50g	500ℓ 250g	
落花15日後（5月下旬）	トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-	黒斑点落葉病 黒赤褐斑	500倍 200g	500ℓ 1,000ml	混用
	モスピラン水溶剤	100g 250g	○	アブラムシ類 モモンシ キンモンホソ	4,000倍 25g	500ℓ 125g	
	ロブラール水和剤	100g 500g	-	黒斑点落葉病	1,500倍 66g	500ℓ 333g	

- ④1 サンリット水和剤および、トレノックスフロアブルは褐斑病に有効です。褐斑病にも登録が拡大になりました。
- ④2 リンゴハダニの多い国ではオサダン・バロック・ピラニカのいずれかを散布する。（5月下旬）

薬剤による摘果（JAの営農指導に準じて下さい）

マイクロデナボン水和剤85	500g	○	摘果	1,200倍 83g	350ℓ以上
---------------	------	---	----	---------------	--------

ぶどう

- ①クロヒメゾウムシ防除は早めに。
- ②第1回のジベ処理は適期を逃さずに。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
展葉初期（5月上旬・中旬）	マイクロデナボン水和剤85	500g	○	クロヒメゾウムシ コガネムシ類	1,000倍 100g	200ℓ 200g	混用 いずれか デラウエア
	アドマイヤー水和剤 ベストガード水溶剤	500g	○	フタテンヒメヨコバイ チャノキアザミウマ	1,000倍 100g	200ℓ 200g	
	ベンコゼブフロアブル	500ml	-	黒とう病	1,000倍 100ml	200ℓ 200ml	
	デランフロアブル	500ml	-	黒とう病	1,000倍 100ml	200ℓ 200ml	混用 いずれか 欧州種
	ジマンダイセン水和剤	500g 1kg	-	黒とう病	600倍 166g	200ℓ 332g	
	マイクロデナボン水和剤85	500g	○	クロヒメゾウムシ フタテンヒメヨコバイ	1,000倍 100g	200ℓ 200g	
	アドマイヤー水和剤 ベストガード水溶剤	500g	○	フタテンヒメヨコバイ	1,000倍 100g	200ℓ 200g	
	マネージ水和剤	500g	-	うどんこ病 黒とう病	2,000倍 50g	200ℓ 100g	混用 いずれか 欧州種
	ベンコゼブフロアブル	500ml	-	黒とう病	1,000倍 100ml	200ℓ 200ml	
	マネージ水和剤	500g	-	黒とう病	2,000倍 50g	200ℓ 100g	混用 いずれか 欧州種
デランフロアブル	500ml	-	黒とう病	1,000倍 100g	200ℓ 200ml		
アリエッティC水和剤	500g	-	黒とう病	600倍 166g	200ℓ 332g		
5月下旬	マイクロデナボン水和剤85	500g	○	チャノキアザミウマ クロヒメゾウムシ コガネムシ類	1,000倍 100g	200ℓ 200g	クロヒメゾウムシ多い場合いずれかを加用する。
	ジベレリン	200mg	-	無核果	水2ℓ 200mg	浸漬10a 8～10箱	

1. 欧州種・うどんこ病・黒とう病の発生が多い園ではマネージ水和剤2,000倍を使用する（展葉初期）。
2. ハウス・雨よけテント栽培で灰色カビ病の発生が多い園では、開花前にオーソサイド水和剤1,000倍加用を散布する。
3. アリエッティC水和剤はオリンピアに薬害の生ずる恐れがあるので使用しない。

もも

- ①モモハモグリガの重点防除は落花直後です。
- ②前年、せん孔細菌病の多かった園では散布間隔を開けないように防除しましょう。
- ③灰星病と黒星病の防除は必ず実施しよう。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
5月上旬（落花直後）	ダコレックス水和剤	250g 500g	-	灰星病	800倍 125g	300ℓ 375g	混用 いずれか
	ノーモルト乳剤	500ml	-	モモハモグリガ	2,000倍 50ml	300ℓ 150ml	
	アドマイヤー水和剤	100g 500g	○	アブラムシ類 モモハモグリガ	1,000倍 50g	300ℓ 150g	
	マイコシールド	500g	-	せん孔細菌病	2,000倍 50g	300ℓ 150g	
	ストマイ液剤20	500ml	-	せん孔細菌病	1,000倍 100g	400ℓ 400g	
	ロブラール水和剤 スミレックス水和剤 (ダコレックス水和剤)	100g 500g	-	灰星病	1,500倍 66g (800倍)	300ℓ 200g (375g)	
	花ぐされ多い園ではさらに散布する。						
5月中旬・下旬	サルファーゾル	1,000ml	-	黒星病	400倍 250ml	400ℓ 1,000ml	混用 いずれか
	トップジンM水和剤	250g 500g	-	黒星病	1,500倍 67g	400ℓ 268g	
	デランフロアブル	500ml	-	灰せん孔細菌病	600倍 166ml	400ℓ 666ml	混用 いずれか
	マイコシールド	500g	-	せん孔細菌病	2,000倍 50g	300ℓ 150g	
	ストマイ液剤20	500ml	-	せん孔細菌病	1,000倍 100g	400ℓ 400g	
	ダイアジノン水和剤34	500g 1kg	○	シンクイムシ類 ハマキムシ類 (アブラムシ類)	1,000倍 100g	400ℓ 400g	混用 いずれか
	サイアノックス水和剤	500g	-				
	リンナックル水和剤	500g	○				
	ダーズバンDF	167g	○		3,000倍 33g	400ℓ 133g	
	バイオマックスDF	500g	-		2,000倍 (50g)	400ℓ 200g	
フェニックス顆粒水和剤	100g 125g 250g 500g	-	ハマキムシ類	4,000倍 (25g)	400ℓ 100g		

おうとう

- ①カイガラムシ1回目の防除時期は5月下旬～6月上旬です。
- ②早生種の収穫前日数に留意し防除しましょう。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
満開3日後（5月上旬）	サンリット水和剤	250g	-	灰幼果星菌核病	2,000倍 50g	500ℓ 500g	混用 いずれか 訪花昆虫保護に留意
	オーソサイド水和剤	250g 500g	-	炭そ星病	800倍 125g	500ℓ 625g	
	ロムダンフロアブル	335ml	-	ハマキムシ	3,000倍 33g	500ℓ 167g	
	バイオマックスDF	500g	-	ハマキムシ	2,000倍 50g	500ℓ 500g	
満開15日後（5月中旬）	スコア顆粒水和剤	250g 335g	-	灰星病	2,000倍 50g	700ℓ 350g	混用 いずれか
	※パスワード顆粒水和剤	500g	-	灰星病	1,500倍 66g	700ℓ 466g	
	ベルコート水和剤	100g 500g	-	灰星病	1,000倍 100g	700ℓ 700g	
	オーソサイド水和剤	500g	-	炭そ星病	800倍 125g	700ℓ 875g	
	アクタラ顆粒水溶剤	100g 500g	-	カメムシ類	2,000倍 50g	700ℓ 350g	
	スプラサイド水和剤	500g	○	ショウジョウバエ類 カメムシ類	2,000倍 50g	700ℓ 350g	
	オサダンフロアブル	500ml	-	ハダニ (収穫21日前まで)	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml	
5月下旬	ダニサラバフロアブル	500ml	-	ハダニ (収穫前日以前まで)	1,000倍 100ml	700ℓ 700ml	ハダニ類卵から成虫まで高い効果がある。
5月下旬	オーソサイド水和剤	500g	-	炭そ星菌核病	1,000倍 100g	700ℓ 700g	混用 佐藤錦
	トップジンM水和剤	250g 500g	-	灰幼果星菌核病	1,500倍 66g	700ℓ 466g	
	オンリーワンフロアブル	250ml	-	炭そ星病	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml	
	スプラサイド水和剤	500g	○	ショウジョウバエ類 カメムシ類 ウメシロカイガラムシ	2,000倍 50g	700ℓ 350g	