

# 6月の農薬

No. 3 - 1

平成21年6月1日

農薬の使用量が多くなる時期です。農薬の適正使用を徹底しましょう。

## 水稲

葉いもちや発病前の予防防除が重要です。補植用の残り苗は「葉いもち」の伝染源になるので、ただちに処分して下さい。イモチ病予防のための粒剤・パック剤は発病前に遅れないよう処理すること。

時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病虫害	使用方法、使用量
6月上旬～下旬	トレボン粒剤	2kg	○	イネミズゾウムシ(イネドロオイムシ)	施用は湛水して行い3日間は落水しない。
	スミチオン粉剤3DL	3kg	-	イネドロオイムシ	3kg/10a
6月中旬	オリゼメート粒剤 コラトップ粒剤5 ブイゲット粒剤	3kg	-	葉いもち病 (白葉枯病)	6月15～20日頃に3kg/10a湛水して散布する。
	オリゼメートパック	50g×20パック	-		パック剤は、3cm以上湛水し散布する。藻や表層はく離が発生している水田では使用しない。オリゼメートは20パック/10aコラトップは、13パック/10aをパックのまま投入する。
	コラトップパック	50g×10パック	-		
6月中旬～下旬	イモチエース1キロ粒剤 オリブライ1キロ粒剤	1kg	-	葉いもち病	湛水状態(3～5cm)で均一に散布し、少なくとも4～5日間は湛水状態を保ち、かけ流しをしない。稲の葉に褐点を生じる場合があるので所定の使用量を厳守するとともに、次の事項に注意する。 (1)葉いもちの初発の遅い地域または早生種に対しては、なるべく早い時期(出穂30日前頃まで)に使用する。 (2)中干し直後や急激な温度上昇がおこる気象条件下では、葉に褐点を生じやすいので注意する。
6月中旬～7月下旬	カスラブサイド粉DL	-	-	葉いもち [早期発見につとめ、発生初期に防除する。]	いずれかを3kg/10a散布する。
	ラブサイド粉DL	-	-		
	ビーム粉DL	3kg	-		
	ブラシン粉DL	-	-		
	ノンプラス粉DL	-	-		
	ラブサイドソル	500ml	-		
	カスラブサイドソル	5ℓ	-		
	ビームソル	500ml	-		
	ブラシンフロアブル	500ml	-		
ノンプラスフロアブル	500g	-	1,000倍(10ml/10ℓ)を10a当り120ℓ散布する。		

## 水稲除草剤

初中期一発剤および中期剤の使用は、田植後15～25日に遅れないように散布しましょう。抵抗性アゼナ類ホタルイ等の多い地域は、中期剤を使用しましょう。

### (一発処理除草剤)

時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象雑草	使用方法、使用量
田植後15～20日	トレディワイド1キロ粒剤	1kg	-	ノビエ他、1年生雑草ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヘラオモダカ、多年生雑草	ノビエ2.5葉期を目標に散布する(田植後15日頃)。各薬剤とも一発剤です。
	ストライカー1キロ粒剤	1kg	-		
	トップガンGT1キロ粒剤	1kg	-		
	トップガンフロアブル	500ml	-		

※ストライカーは抵抗性雑草に効果が劣るので注意する。

### (中期剤)

時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象雑草	使用方法、使用量
田植後20～25日	マメットSM1キロ粒剤	1kg	-	ノビエ、マツバイ他一般雑草ホタルイ、ウリカワミズガヤツリヘラオモダカ	養魚池周辺では魚毒性が強いので使用しない。1kg/10a、止水7日間
	ザーベックスDX1キロ粒剤	1kg	-		
田植後20～30日	バサグラン粒剤	3kg	-	一年生広葉雑草ホタルイ、ウリカワミズガヤツリ、セリオモダカヘラオモダカ	イネ科雑草には効果がない。散布前日落水し土壌が湿っている時散布し、3日間入水しない。3kg/10a 液剤は500～700mlを水70～100ℓ/10a
	バサグラン液剤	500ml	-		
	ヒエクリーンバサグラン粒	3kg	-	上記雑草プラスノビエ	ノビエ5葉期まで使用。1000ml/10a(水70～100ℓ)
	クリンチャーバサME液剤	500ml	-		移植後25～40日ノビエ5葉まで100ml/10a(水100ℓ)
	ワイドアタックSC	100ml	-		

### (ノビエ残草対策)

6月下旬～7月上旬	クリンチャーEW	100ml	-	ノビエ	ノビエ5葉期まで使用。100ml/10a(水100ℓ)
	クリンチャージャンボ	50g×20パック	-		ノビエ3葉期まで使用。10a当たり20パックを投入する。少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、落水かけ流しはしない。
	クリンチャー1キロ粒剤	1kg	-		ノビエに対し1.5kg散布で4葉期まで使用。10a当たり1kgの場合は3葉期まで。
	ヒエクリーン1キロ粒剤	1kg	-		ノビエ4葉期まで使用。

※発生中のノビエのみに有効。

## 西洋なし

1. 輪紋病、胴枯病の重点防除時期です。
2. 他樹種への飛散のないように散布してください。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病虫害	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考	
6月上旬	※有機殺菌剤	オキシラン水和剤	500g 1kg 1.67kg	-	輪紋病	600倍 166g	450ℓ 750g	加用する クレフノンを いづれかに 加用散布
		オキシンドー水和剤80	500g	-		1,200倍 83g	450ℓ 375g	
	インダーフロアブル	100ml	-	5,000倍		400ℓ 80ml		
	テルスター水和剤	500g	○	シンクイムシ ハマキムシ ハダバラムシ		1,000倍 100g	450ℓ 450g	
6月上旬・中旬	クレフノン加用 ※有機殺菌剤				輪紋病			加用散布 前回合ピレ剤 ではいづれ を使用し いづれか
	合成ピレスロイド剤	マブリック水和剤20	500g	○	ハマキムシ アブラムシ シンクイムシ	2,000倍 50g	600ℓ 300g	
		テルスター水和剤	500g	○		1,000倍 100g	600ℓ 600g	
		アーデント水和剤	500g	○		1,000倍 100g	600ℓ 600g	
		ダントツ水溶剤	125g 250g	-	シンクイムシ カメムシ カイガラムシ	2,000倍 50g	600ℓ 300g	
6月中旬～下旬	ダニサラバフロアブル	500ml	-	ハダニ	1,000倍 100ml	450ℓ 450ml	発生に応じ加用	
6月下旬～7月下旬	※※有機リン剤加用 ICボルドー412		5kg 10kg	-	輪紋病 (胴枯病)	30倍 3.3kg	600ℓ 20kg	加用散布 にノンを いづれか 加用する
	(無ボルドー地域では) アミスター10フロアブル		500ml	-		1,000倍 100ml	600ℓ 600ml	
	ストロビドドライブフロアブル		500g	-	輪黒黒 斑星 病	2,000倍 50g	600ℓ 300g	
	ナリアWDG		250g	-		2,000倍 50g	600ℓ 300g	
	※有機リン剤	ダイアジノン水和剤34	500g	○		1,000倍 100g	450ℓ 450g	
サイアノックス水和剤		500g	○	シンクイムシ ハマキムシ アブラムシ	1,000倍 100g	450ℓ 450g		
ダズバンDF		167g	○		3,000倍 33g	450ℓ 150g		

※ナリアWDGは西洋なし(ル・レクテ)、ぶどう(ピオーネ)に葉害が出るので飛散しないように注意する。



もっと近くに。

全農山形県本部 生産資材部

お問い合わせ・ご注文の電話番号  
023-634-8157

ご注文の際のFAX番号  
023-634-8182

農薬はJAマークの製品を!

先入れ先出しの励行を!

# 6月の農薬

No. 3 - 2

平成21年6月1日

農薬の飛散が起こらないよう細心の注意を払いましょう。

## りんご

1. 胴腐らんを発見したら患部を削りとり、ペフラン塗布剤、またはトップジンMペーストを塗布する。
2. シンクイムシ類(ハリトシ)防除の重要な時期なので遅れないように散布しましょう。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
(落花25日後)	トレノックスフロアブル	1ℓ・2ℓ	-	黒斑点 星落葉 葉病	500倍 200ml	550ℓ 1,100ml	混用する クレフノンを加用し散布する
	バイトレン水和剤5	100g 500g	-	うどんこ病	1,000倍 100g	550ℓ 550g	
	展着剤	500ml	-		5,000倍 20ml	550ℓ 110ml	
6月上旬 斑点落葉病重点防除	ポリベリン水和剤	500g	-	斑すす黒点 斑すす黒点 落葉病	1,500倍 67g	700ℓ 467g	いずれか 加用
	スコア顆粒水和剤	250g 335g	-	斑すす黒点 斑すす黒点 落葉病	3,000倍 33g	700ℓ 233g	
	ロブラール水和剤	500g	-	斑すす黒点 斑すす黒点 落葉病	1,500倍 67g	700ℓ 469g	
	オーソサイド水和剤	500g	-	黒褐斑 星斑 葉病	800倍 125g	700ℓ 875g	いずれか 加用
	トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-	斑すす黒点 斑すす黒点 落葉病	500倍 200g	700ℓ 1,400ml	
	サイアノックス水和剤	500g 1kg	-		1,000倍 100g	700ℓ 700g	いずれか 加用
	スプラサイド水和剤	500g	○		1,500倍 67g	700ℓ 467g	
	マブリックEW	500ml	○	モハキモン	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml	合成ピレスロイド剤
	テルスター水和剤	500g	○		1,000倍 100g	700ℓ 700g	
	アードント水和剤	500g	○		1,000倍 100g	700ℓ 700g	
6月下旬～7月上旬	ロディー水和剤	500g	○		1,000倍 100g	700ℓ 700g	
	アクタラ顆粒水溶剤	100g 500g	-	シンクイムシ類	2,000倍 50g	700ℓ 350g	
	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	シンクイムシ類	4,000倍 25g	700ℓ 175g	
	展着剤	500ml	-		5,000倍 20ml	700ℓ 140ml	
	ICボルドー412	5kg 10kg	-		20倍 5kg	700ℓ 35kg	
	オキシラン水和剤	500g 1kg 1.67kg	-	斑すす黒点 斑すす黒点 落葉病	600倍 166g	700ℓ 1,166g	いずれか 混用散布
	パスポートフロアブル	500ml	-	斑すす黒点 斑すす黒点 落葉病	1,000倍 100ml	700ℓ 700ml	
	ストロビーDF	250g 500g	-	斑すす黒点 斑すす黒点 落葉病	2,000倍 50g	700ℓ 350g	
	ナリアWDG	250g	-	斑すす黒点 斑すす黒点 落葉病	2,000倍 50g	700ℓ 350g	
	ベルコート水和剤	500g	-		1,000倍 100g	700ℓ 700g	
6月中旬下旬	オキシンドー水和剤80	500g	-	斑すす黒点 斑すす黒点 落葉病	1,200倍 83g	700ℓ 583g	早生種に薬害注意
	ロブド水和剤	500g	-	斑すす黒点 斑すす黒点 落葉病	600倍 166g	700ℓ 1,166g	
6月中旬	ダントツ水溶剤	250g	-	シンクイムシ類	1,000倍 100g	700ℓ 700g	
	テルスター水和剤	500g	-	シンクイムシ類	4,000倍 25ml	700ℓ 175ml	
6月中旬	ノーモルト乳剤	500ml	-	シンクイムシ類	4,000倍 25ml	700ℓ 175ml	
6月中旬	ダニサラバフロアブル	500ml	-	ハダニ	1,000倍 100ml	700ℓ 700ml	

※1 ストロビーDFはおうとうでは薬害が生じる恐れがあるので、周辺にある場合はかからないよう注意する。  
 ※2 ナリアWDGは、西洋なし(ル・レクテ)・ぶどう(ピオーネ)に薬害が出るので飛散しないように注意する。

## ぶどう

1. 灰色かび防除は1回目のジベ処理後、3～4日後が適期です。
2. 2回目ジベ処理は、満開10日後頃です。遅れないように！

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考	
6月上旬	オーソサイド水和剤80	250g 500g	-	晩腐病	800倍 125g	300ℓ 375g	混用する	
	ロブラール水和剤	100g 500g	-	色かび	1,500倍 67g	300ℓ 200g		
	フロンサイドSC	500ml	-	色かび	2,000倍 50ml	300ℓ 150ml		
	ポリベリン水和剤	250g 500g	-	灰う黒と	1,000倍 100g	300ℓ 300g	いずれかを散布する	
	ベンコゼブ水和剤	250g 500g	-	と腐病	1,000倍 100g	300ℓ 300g		
	ホライズンドライフロアブル	200g	-	と腐病	2,500倍 40g	300ℓ 120g		
	スイッチ顆粒水和剤	500g	-	色かび	2,000倍 50g	300ℓ 150g		
	ICボルドー66D	5kg	-	晩腐病	40倍 2.5kg	300ℓ 7.5kg		
	6月中旬	ジベレリン	粉末 200mg (大管1本)	-		濃度 75~100ppm		
		錠剤	25mg (一錠)	-	2回目処理	濃度 80ppm 100ppm 粉末大管200mg当り水量 2.5ℓ 2ℓ 錠剤25mg当り水量 310cc 250cc		
6月中旬	サニバー	500g	-	晩腐病	1,000倍 100g	300ℓ 300g	混用散布 ヨコバイが多いときはアドマイヤー水1,000倍	
	マイクロデナボン水和剤85	500g	-	ドウスカシバ	1,000倍 100g	300ℓ 300g		
	コロマイト水和剤	100g 500g	-	ハダニ	2,000倍 50g	300ℓ 150g	ボルドー混用不可	
6月中旬	オサダンフロアブル	250ml	-	ハダニ	1,000倍 100g	300ℓ 300g		

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月中旬下旬	オーソサイド水和剤80	500g	-	晩腐病	800倍 125g	250ℓ 312g	デラウェア
	ストロビーDF	500g	-	晩腐病・黒とう	2,000倍 50g	300ℓ 150g	いずれか 混用散布
	アミスター10フロアブル	500ml	-	晩腐病・黒とう	1,000倍 100ml	300ℓ 300ml	
	ダイアジノン水和剤34	500g 1kg	○	アブラムシ・ヨコバイ	1,000倍 100g	300ℓ 300g	
6月中旬	コロマイト水和剤	500g	-	ハダニ	2,000倍 50g	300ℓ 150g	単用散布

## もも

1. 灰星病防除を徹底しましょう。
2. セン孔細菌病が前年多発した園では散布間隔を開けずに防除してください。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬	トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-	せん孔細菌病	500倍 200ml	400ℓ 800ml	展着剤は加用しない
	デランフロアブル	500ml	-	黒星病・灰星病	600倍 100ml	400ℓ 400ml	
6月上旬	ウメシロカイガラムシ重点防除						
	サルファーゾル	1ℓ 5ℓ	-	黒星病	400倍 250ml	400ℓ 1ℓ	無袋 と有機リン剤
	ストロビーDF	500g	-	灰星病、黒星病	2,000倍 50g	400ℓ 200g	有袋
	ナリアWDG	250g	-	灰星病、黒星病	2,000倍 50g	400ℓ 200g	
	アミスター10フロアブル	500ml	-		1,000倍 100ml	1,000倍 400ml	
6月中旬	※〔有機リン剤(殺虫剤)〕						
	サイアノックス水和剤	500g 1kg	-	カイガラムシ類	1,000倍 100g	400ℓ 400g	モモハモグリガの多い園では、6月中旬にDOVP乳75・1,500倍を使用する。
	リンナックル水和剤	500g	○	カイガラムシ類(モモハモグリガ)	3,000倍 33g	400ℓ 133g	
	ダズバンDF	167g	○		5,000倍 20ml	400ℓ 80ml	
	展着剤	500ml	-		5,000倍 20ml	400ℓ 80ml	
	サルファーゾル	1ℓ	-	黒星病	400倍 250ml	400ℓ 1ℓ	
	ロブラール水和剤	500g	-		1,500倍 67g	400ℓ 266g	いずれか 混用
	スコア顆粒水和剤	250g 335g	-	灰星病	2,000倍 50g	400ℓ 200g	
	ダコニール1000	500ml	-		1,000倍 100ml	400ℓ 400ml	
	アンビルフロアブル	500ml	-		1,000倍 100ml	400ℓ 400ml	
6月中旬	マブリック水和剤20	500g	○		2,000倍 500g	400ℓ 200g	使い6月
	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	シンクイムシ類	4,000倍 25g	700ℓ 175g	いずれか 散布
	テルスター水和剤	500g	○	シンクイムシ類	1,000倍 100g	400ℓ 400g	
	アードント水和剤	500g	○		1,000倍 100g	400ℓ 400g	
	※〔有機リン剤〕			シンプライムシ	6月上旬の有機リン剤参照		
	ダニサラバフロアブル	500ml	-	ハダニ	1,000倍 100ml	400ℓ 400ml	発生に応じ加用
6月中旬	展着剤	500ml	-		5,000倍 20ml	400ℓ 80ml	

## おうとう

※灰星病防除を徹底しましょう。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬	アンビルフロアブル	100ml 500ml	-	灰星病	1,000倍 100ml	700ℓ 700ml	
	ナポレオン等晩生種						
	ロブラール水和剤	500g	-	灰星病	1,500倍 67g	700ℓ 466g	いずれか 混用散布
	スミレックス水和剤	500g	-	せん孔	1,500倍 67g	700ℓ 466g	
6月中旬	オーソサイド水和剤80	250g 500g	-		1,000倍 100g	700ℓ 700g	発生に応じ加用
	ダニサラバフロアブル	500ml	-	ハダニ	1,000倍 100g	700ℓ 700g	
	ロブラールアクア500	500ml	-		1,500倍 67ml	500ℓ 335ml	いずれか ロブラールフロアブルは単用散布(混用不可)
	ロブラールフロアブル	500ml	-		800倍 125ml	500ℓ 625ml	
	アミスター10フロアブル	500ml	-	灰星病	1,000倍 100ml	500ℓ 500g	
	ナリアWDG	250g	-		2,000倍 50g	500ℓ 250g	
	インダーフロアブル	100ml	-		5,000倍 20ml	500ℓ 100ml	
	アディオンフロアブル	500ml	○	ショウジョウバエ(着色期以降)	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml	いずれか
6月中旬	テルスターフロアブル	100ml	○	ハダニ	4,000倍 25ml	700ℓ 175ml	
	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	ショウジョウバエ	2,000倍 50g	700ℓ 350g	

※アミスター10FLはりんごの一部品種(あかね等)では薬害が生じるので、飛散等により散布液がかからないよう注意する。

## かき

アザミウマの重点防除時期です。落葉病の防除も重要な時期です。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬(開花直前)	パーマチオン水和剤	500g	○		1,000倍	500ℓ 500g	いずれか 混用散布
	バイスロイドEW	100ml 500ml	○	アザミウマ	2,000倍 50ml	500ℓ 250ml	
	マブリック水和剤20	100g 250g 500g	○		4,000倍 25g	500ℓ 125g	
	トップジンM水和剤	250g 500g	-	灰色かび病	1,500倍 67g	500ℓ 334g	いずれか
6月中旬	ベンコゼブ水和剤	250g 500g	-	落葉病	600倍 166g	500ℓ 830g	
	アミスター10フロアブル	500ml	-	落葉病	1,000倍 100g	500ℓ 500g	
6月中旬	スプラサイド水和剤	500g	○	アザミウマ	1,000倍 100g	500ℓ 500g	6月上旬の有機殺菌剤参照
6月下旬	有機殺菌剤			落葉病			
	ジェイエース水溶剤	100g 500g 1kg	-	チャノキイロアザミウマ	1,000倍 100g	500ℓ 500g	