

# 殺ダニ剤の登録一覧表

(2019年用)

JA全農山形 生産資材部

2018年12月1日 作成

| 薬剤名         | ボルドー液・混用 | 希釈倍数  |       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 特 性 お よ び 注 意 事 項 |       |       |  |
|-------------|----------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|--|
|             |          | りんご   | おうとう  | もも    | ぶどう        | なし    | きゅうり  | トマト   | なす    | すいか   | いちご   | メロン   | かき    | 菊(花き) |                   | 食用ぎく  | ばら    |  |
| ダニサラバフロアブル  | ×        | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000      | 1,000 | 1,000 | -     | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000             | 1,000 | 1,000 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ハダニの全ての生育ステージに対して効果を示し、特に幼虫から若虫に対して効果がある。</li> <li>・天敵その他有用動物に対して影響が少ない。</li> <li>・ボルドー液との混用は避け、近接散布は前後14日以上あける。</li> <li>・アリエンティック水和剤、カルシウム剤と混用する場合、ダニサラバフロアブルを先に溶かす。</li> <li>・スターマイトフロアブル、ダニコンクフロアブルを使用した場合、抵抗性出現防止のためダニサラバフロアブルは使用しない。</li> <li>・他に小粒核果類、ピーマン、花き類・観葉植物等で登録あり。</li> </ul>   |
| スターマイトフロアブル | ×        | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000      | 2,000 | 2,000 | -     | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000             | 2,000 | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ハダニの全ての生育ステージに対して効果がある。</li> <li>・ダニサラバフロアブル、ダニコンクフロアブルを使用した場合、抵抗性出現防止のためスターマイトフロアブルは使用しない。</li> <li>・ボルドー液との混用および14日以内の近接散布は効果があるのを避ける。</li> <li>・有袋栽培の洋なしに使用する場合は、果実の薬斑が目立つおそれがあるので、袋かけ前の散布はしない。</li> <li>・ペフラン液剤、アリエンティック水和剤と混用する場合、スターマイトフロアブルを先に溶かす。</li> <li>・有用昆虫(ミツバチ、マルハナバチ、マメコバチ)およびカブリダニ等の天敵に対する影響が少ない。</li> <li>・他に小粒核果類、食用はおすき、りんどう、ピーマン等で登録あり。</li> </ul>  |
| ダニコンクフロアブル  | ×        | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000      | 2,000 | -     | -     | -     | -     | 3,000 | -     | 2,000 | -     | -                 | -     | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ハダニの全ての生育ステージに対して効果がある。</li> <li>・天敵その他有用動物に対して影響が少ない。</li> <li>・ダニサラバフロアブル、スターマイトフロアブルを使用した場合、抵抗性出現防止のためダニコンクフロアブルは使用しない。</li> <li>・ボルドー液との混用および14日以内の近接散布は効果があるのを避ける。</li> <li>・他に小粒核果類等で登録あり。</li> </ul>  |
| ダニゲッターフロアブル | ×        | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000      | 2,000 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ハダニ類の全ステージに効果があるが、特に卵・幼虫に対する効果が高く、残効性が長い。</li> <li>・運動的だが、成虫には不妊作用を示す。</li> <li>・ボルドー液との同時散布および前後14日以内の近接散布は効果がある恐れがあるので避ける。</li> <li>・新梢伸長期の日本なし(二十世紀を除く)に使用する場合は、以下の事項に注意する。</li> <li>・(1)豊水、新高、長十郎には新葉に薬害を生じる恐れがあるので使用しない。</li> <li>・(2)有機リン剤との同時散布および10日以内の近接散布は新葉に薬害を生じる恐れがあるので避ける。</li> <li>・おうとうに使用する場合は、新梢伸長期に薬害を生じることがあるので、葉の硬化を持って使用する。</li> <li>・キャベツ、はくさい、こまつな、ねぎ、ばらに対して薬害を生ずる恐れがあるので、付近にある場合から注意すること。</li> <li>・開花期の水稲に本剤がかかった場合、不稔などの薬害を生ずる場合があるのでから注意すること。</li> <li>・小粒核果類で登録あり。</li> </ul> |
| バロックフロアブル   | ×        | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000      | 2,000 | 2,000 | -     | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | -     | 2,000 | -                 | 2,000 | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成虫に対する活性はないが、卵・幼虫・若虫の各ステージに活性が高く長い残効性がある。</li> <li>・ボルドー液散布14日前まで使用し、ボルドー液散布後は使用しない。</li> <li>・すもも、花き類・観葉植物にも登録あり。</li> </ul>  |
| マイトコーネフロアブル | ×        | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000      | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -                 | -     | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ミツバチ・蚕およびカブリダニ等の天敵に対する影響が少ない。</li> <li>・ボルドー液との混用は避け、近接散布は前後14日以上あける。</li> <li>・小粒核果類、ミニトマト、ピーマン、食用はおすきにも登録あり。</li> </ul>  |
| コロマイト水和剤    | ○        | 2,000 | -     | -     | 2,000      | 2,000 | 2,000 | -     | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | -     | 2,000 | 2,000             | 2,000 | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・薬に長期毒性があるので、桑園周辺では飛散しないように注意すること。</li> <li>・乳剤は、薬害防止のため安全性が確認された薬剤のみ混用する。</li> <li>・乳剤は、汎用性展着剤以外および葉面散布肥料とは混用しない。</li> <li>・乳剤はトマト・ミニトマトのコンジラミ類、トマトサビダニ、ハモグリバエ等で登録あり。</li> <li>・乳剤は小粒核果類、ミニトマト、食用はおすきにも登録あり。</li> </ul>  |
| コロマイト乳剤     |          | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -          | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -     | 1,500 | -                 | -     | -     |  |
| コテツフロアブル    | ×        | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000      | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | -     | 2,000 | 2,000 | 2,000             | 2,000 | 2,000 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ぶどうは収穫60日前までの使用なので注意する。</li> <li>・蚕毒性があるので、桑園周辺では飛散しないように注意すること。</li> <li>・ハウサイ・ダイコン・きゅうり・なすの幼苗期は薬害の恐れがあるので使用不可。</li> <li>・オクラではオオタバコガで登録あり。</li> <li>・スイカではミナミキアザミウマにも登録あり。</li> <li>・小粒核果類、ミニトマト、ピーマン、花き類・観葉植物(きく、ストックを除く)にも登録あり。</li> </ul>   |
| ピラニカEW      | ○        | -     | 1,000 | 1,000 | -          | -     | 2,000 | -     | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | -     | 1,000 | -                 | 2,000 | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・原液を皮膚や目に直接付着しないようにする。(刺激が強い)</li> <li>・サンマイト・ダニロンは交差抵抗を示すので混用は避ける。</li> <li>・EWは花き類・観葉植物(ハネツバキ、きくを除く)で登録あり。</li> </ul>   |
| ピラニカ水和剤     |          | 1,000 | 1,000 | 1,000 | (大粒種)2,000 | 1,000 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,000 | -     | -                 | -     | -     |  |
| サンマイト水和剤    | ○        | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000      | 1,000 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,000 | -     | -                 | -     | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・原液を皮膚や目に直接付着しないようにする。(刺激が強い)</li> <li>・ダニロン・ピラニカは交差抵抗を示すので混用は避ける。</li> <li>・フロアブル剤は、えだまめ、食用はおすきのコンジラミ類に登録あり。</li> <li>・水和剤はすもも、キウイフルーツに登録あり。</li> </ul>  |
| サンマイトフロアブル  |          | -     | -     | -     | -          | -     | 1,000 | -     | -     | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -     | 1,000 | 1,000             | -     | -     |  |
| ダニロンフロアブル   | ○        | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000      | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -                 | 1,000 | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・原液を皮膚や目に直接付着しないようにする。(刺激が強い)</li> <li>・サンマイト・ピラニカは交差抵抗を示すので混用は避ける。</li> <li>・キウイフルーツ、うめ、ミニトマト、ほろりんそう、ピーマン、花き類・観葉植物にも登録あり。</li> </ul>   |
| カネマイトフロアブル  | ×        | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000      | 1,000 | 1,000 | -     | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -     | 1,000 | 1,000             | -     | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アリエンティックと混用する場合は、カネマイトを先に希釈し混用する。</li> <li>・ボルドー液との混用は避け、近接散布は前後14日以上あける。</li> <li>・うめ、すもも、うり根(漬物用)、ピーマンにも登録あり。</li> </ul>   |

※本資料作成以降に農薬の適用内容が変更になる場合もあるため、ご使用される際にはラベルの登録内容を再度ご確認ください。なお、記載している希釈倍数については、登録濃度の高い希釈倍数のみを記載しています。

※各薬剤共、ボルドー液と混用して使用すると効果が低下したり、残効期間が短くなるようので留意願います。

※殺ダニ剤は抵抗性回避のため各薬剤共、年1回に厳守願います。

