

6月の農薬

No. 3 - 1

平成25年6月1日

農薬の使用量が多くなる時期です。農薬の適正使用を徹底しましょう。

水稲

葉いもちや発病前の予防防除が重要です。補植用の残り苗は「葉いもち」の伝染源になるので、ただちに処分して下さい。イモチ病予防のための粒剤・パック剤は発病前に遅れないよう処理すること。

時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	使用方法、使用量	
6月上旬～下旬	トレボン粒剤	2kg	-	イネミズゾウムシ(イネドロオイムシ)	施用は湛水して行い3日間は落水しない。 3kg/10a	
	シクロパック粒剤	600g(60g×10コ)	-			
	トレボン粉剤DL	3kg	-			
	MR.ジョーカーEW	500ml	-			フタオビコヤガ 2,000倍 6月下旬～7月上旬が散布適期
6月中旬	オリゼメート粒剤 コラトップ粒剤5 フイゲット粒剤	3kg	-	葉いもち病 (白葉枯病)	6月15～20日頃に1kg、3kg/10a湛水して散布する。 パック剤は、3cm以上湛水し散布する。薬や表層はく離が発生している水田では使用しない。コラトップは、10～13パック/10aをパックのまま投入する。	
	ルーチン粒剤	1kg	-			
	コラトップジャンボ	50g×10パック	-			
6月中旬～下旬	オリブライ1キログラム	1kg	-	葉いもち病	湛水状態(3～5cm)で均一に散布し、少なくとも4～5日間は湛水状態を保ち、かけ流しをしない。稲の葉に褐点を生じる場合があるので所定の使用量を厳守するとともに、次の事項に注意する。 (1)葉いもちの初発の遅い地域または早生種に対しては、なるべく早い時期(出穂30日前頃まで)に使用する。 (2)中干し直後や急激な温度上昇がおこる気象条件下では、葉に褐点を生じやすいので注意する。	
	※嵐剤、オリブライ剤、アミスター剤は同一成分とみなし連用は避ける。					
6月中旬～7月下旬	ダブルカット粉剤DL	3kg	-	葉いもち (早期発見につとめ、発生の初期に防除する。)	いずれかを3kg/10a散布する。 1,000倍(10ml/10ℓ)を10a当り120ℓ散布する。	
	ラブサイド粉剤DL		-			
	ビーム粉剤DL		-			
	ブラシン粉剤DL		-			
	ノンプラス粉剤DL		-			
	ラブサイドフロアブル		500ml			-
	ダブルカットフロアブル		-			
	ビームゾル		500ml			-
	ブラシンフロアブル		500ml			-
ノンプラスフロアブル	500g	-				

水稲除草剤

初中期一発剤および中期剤の使用は、田植後15～25日に遅れないように散布しましょう。抵抗性アゼナ類ホタルイ等の多い地域は、中期剤を使用しましょう。

(一発処理除草剤) 初期除草剤との体系による防除を基本とする。

時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象雑草	使用方法、使用量
田植後15日	コメット1キログラム	1kg	-	ノビエ他、一年生雑草 ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヘラオモダカ、多年生雑草	ノビエ2.5葉期を目標に散布する(田植後15日頃)。
	トップガンGT1キログラム75	1kg 10kg	-		
	トップガンフロアブル	500ml	-		

(中期剤)

時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象雑草	使用方法、使用量	
田植後25～30日	フォローアップ1キログラム	1kg	-	ノビエ、マツバイ他一年生雑草 ホタルイ、ウリカワ ミズガヤツリ、ヘラオモダカ	キュウリへの薬害が懸念され既存中期剤の使用を控えている地域でも使用可能。	
田植後25日	マメットSM1キログラム	1kg	-	オモダカ	養魚池周辺では魚毒性が強いので使用しない。1kg/10a、止水7日間	
	ブイゴールSM1キログラム	1kg	-			
田植後20～30日	バサグラン粒剤	3kg	-	一年生広葉雑草 ホタルイ、ウリカワ ミズガヤツリ、セリオモダカ ヘラオモダカ	イネ科雑草には効果がない。散布前日落水し土壌が湿っている時散布し、3日間入水しない。 3kg/10a 液剤は500～700mlを水70～100ℓ/10a	
	バサグラン液剤	500ml	-			
	ワイドパワー粒剤	3kg	-			
	クリンチャーバスマE液剤	500ml	-			上記雑草プラスノビエ
	ワイドアタックSC	100ml	-			ノビエ5葉期まで使用。1000ml/10a(水70～100ℓ) 移植後25～40日ノビエ5葉まで100ml/10a(水100ℓ)

(ノビエ残草対策)

6月下旬～7月上旬	クリンチャーEW	100ml	-	ノビエ	ノビエ5葉期まで使用。100ml/10a(水100ℓ)
	クリンチャージャンボ	50g×20パック	-		ノビエ3葉期まで使用。10a当たり20パックを投入する。少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、落水かけ流しはしない。
	クリンチャー1キログラム	1kg	-		ノビエに対し1.5kg散布で4葉期まで使用。10a当たり1kgの場合は3葉期まで。
	ヒエクリーン豆つぶ250	250g	-		ノビエ4葉期まで使用。省力処理剤
	ヒエクリーン1キログラム	1kg	-		ノビエ4葉期まで使用。
	ヒエクッパ1キログラム	1kg	-		ノビエ5葉期まで使用。その他シズイ、クログワイにも効果あり

※発生中のノビエのみに有効。

西洋なし

1. 輪紋病、胴枯病の重点防除時期です。
2. 他樹種への飛散のないように散布してください。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考	
6月上旬	※有機殺菌剤 オキシラン水和剤	500g 1kg	-	輪紋病	600倍 166g	450ℓ 750g	いづれかにバイカルティクレフノンを加用する	
	オキシンドー水和剤80	500g	-		1,200倍 83g	450ℓ 375g		
	インダーフロアブル	100ml	-		5,000倍 20ml	400ℓ 80ml		
	テルスター水和剤	500g	-		(シンクイムシ) (ハマキムシ)	1,000倍 100g		450ℓ 450g
	アディオオン水和剤	100g 250g	-		(ハダダシニ) アブラムシ類	2,000倍 50g		450ℓ 225g
6月上旬・中旬	バイカルティまたはクレフノン加用 ※有機殺菌剤			輪紋病			いづれか	
	合ピレ テルスター水和剤	500g	-	ハマキムシ類 アブラムシ類 シンクイムシ類	1,000倍 100g	600ℓ 600g		
	ネオニコ ダントツ水溶剤	125g 250g	-	シンクイムシ類 カメムシ類 コイカイガラムシ類	2,000倍 50g	600ℓ 300g		
6月中～下旬	ダニサラバフロアブル	500ml	-	ハダダニ類	1,000倍 100ml	450ℓ 450ml	発生に応じ加用	
6月下旬～7月下旬	※※有機リン剤加用 ICボルドー412	5kg 10kg	-	輪紋病(胴枯病)	30倍 3.3kg	600ℓ 20kg	加用散布	
	(無ボルドー地域では) アミスター10フロアブル	500ml	-		1,000倍 100ml	600ℓ 600ml		
	ストロビードライフロアブル	250g 500g	-	輪黒星 黒斑病	2,000倍 50g	600ℓ 300g		
	ナリアWDG	250g	-		2,000倍 50g	600ℓ 300g		
	※有機リン剤 ダイアジノン水和剤34	500g	○		1,000倍 100g	450ℓ 450g		
	サイアノックス水和剤	500g	-	シンクイムシ類 ハマキムシ類 アブラムシ	1,000倍 100g	450ℓ 450g		
ダーズバンドF	167g	○		3,000倍 33g	450ℓ 150g			

※ナリアWDGは西洋なし(ル・レクチェ)、ぶどう(ピオーネ)に薬害が出るので飛散しないように注意する。



もっと近くに。

全農山形県本部 生産資材部

電話番号
023-634-8157

FAX番号
023-634-8182

農薬はJAマークの製品を!

先入れ先出しの励行を!

6月の農薬

No. 3 - 2

平成25年6月1日

農薬の飛散が起らないよう細心の注意を払いましょう。

りんご

1. 胴腐らんを発見したら患部を削りとり、ペフラン塗布剤、またはトップジンMペーストを塗布する。
2. シンクイムシ類（ハリトージ）防除の重要な時期なので遅れないように散布しましょう。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬 (落花25日後)	トレノックスフロアブル	1ℓ・2ℓ	-	黒斑病 星点落葉病	500倍 200ml	550ℓ 1,100ml	混用する
	展着剤	500ml	-		5,000倍 20ml	550ℓ 110ml	
6月上旬 斑点落葉病重点防除	スコア顆粒水和剤	250g 335g	-	斑点点落葉病	3,000倍 33g	700ℓ 233g	いずれか
	ロブラール水和剤	500g	-	斑点点落葉病	1,500倍 67g	700ℓ 469g	いずれか
	オーソサイド水和剤80	500g	-	黒褐星斑病	800倍 125g	700ℓ 875g	いずれか
	トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-	すすすす点斑病	500倍 200ml	700ℓ 1,400ml	いずれか
	サイアノックス水和剤	500g 1kg	-		1,000倍 100g	700ℓ 700g	有機リン剤
	スプラサイド水和剤	500g	○		1,500倍 67g	700ℓ 467g	合成ピレスロイド剤
	テルスター水和剤	500g	-		1,000倍 100g	700ℓ 700g	いずれかを加用
	アーデント水和剤	500g	-				
	ロディー水和剤	500g	○				
	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	シンクイムシ類	4,000倍 25g	700ℓ 175g	いずれかを加用
	展着剤	500ml	-			5,000倍 20ml	700ℓ 140ml
6月下旬〜7月上旬	ICボルドー412	5kg 10kg	-		20倍 5kg	700ℓ 35kg	
	オキシラン水和剤	500g 1kg 1.67kg	-	斑点点落葉病	600倍 166g	700ℓ 1,166g	いずれか
	バスポート顆粒水和剤	500g	-	黒褐星点斑病	1,000倍 100g	700ℓ 700g	いずれか
	ストロビードライフロアブル	250g 500g	-	すすすす点斑病	2,000倍 50g	700ℓ 350g	いずれか
	ナリアWDG	250g	-		2,000倍 50g	700ℓ 350g	いずれか
	ベルコート水和剤	500g	-		1,000倍 100g	700ℓ 700g	いずれか
	オキシンドー水和80	500g	-	黒斑点斑病	1,200倍 83g	700ℓ 583g	早生種に薬害注意
	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	シンクイムシ類	4,000倍 25g	700ℓ 175g	
テルスター水和剤	500g	-	ギンモンハモグリガ	1,000倍 100g	700ℓ 700g		
ノーマルト乳剤	100ml 500ml	-	キンモンハモグリガ	4,000倍 25ml	700ℓ 175ml		
6月中旬	ダニサラバフロアブル	500ml	-	ハダニ類	1,000倍 100ml	700ℓ 700ml	

※1 ストロビードライフロアブルはおうとうでは薬害が生じる恐れがあるので、周辺にある場合はかからないよう注意する。
 ※2 ナリアWDGは、西洋なし(ル・レクテ)・ぶどう(ピオーネ)に薬害が出るので飛散しないように注意する。

ぶどう

1. 灰色かび防除は1回目のジベ処理後、3〜4日後が適期です。
2. 2回目ジベ処理は、満開10日後頃です。遅れないように！

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬	テーク水和剤	250g	-	晩灰色腐かび病	1,000倍 100g	300ℓ 300g	
	オーソサイド水和剤80	500g	-	褐斑病	1,000倍 100g	300ℓ 300g	
	ベンコゼブフロアブル	500ml	-	べ晩と腐病	1,000倍 100ml	300ℓ 300ml	
	ホライズンドライフロアブル	200g	-	べと病	2,500倍 40g	300ℓ 120g	いずれか
	スイッチ顆粒水和剤	500g	-	晩灰色腐かび病	2,000倍 50g	300ℓ 150g	いずれかを散布する
	ICボルドー66D	5kg	-	晩べと腐病	40倍 2.5kg	300ℓ 7.5kg	
6月中旬(開花直前)	ジベレリン				濃度 75~100ppm		
	2回目処理				濃度 80ppm 100ppm		
	錠剤				粉末大管200mg当り水量 2.5ℓ 2ℓ 錠剤25mg当り水量 310cc 250cc		
6月中旬	ジェイエース水溶剤	100g 500g	-	チャノキイロアザミウマ	2,000倍 50g	300ℓ 150g	混用散布ヨコバイが多いときはアドマイヤー水和剤1,000倍
	アーデント水溶剤		-		1,000倍 100g	300ℓ 300g	
	コロマイト水和剤	100g 500g	-	ハダニ	2,000倍 50g	300ℓ 150g	ボルドー混用不可

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月中旬下旬	オーソサイド水和剤80	500g	-	晩腐病	800倍 125g	250ℓ 312g	デラウェア
	ストロビードライフロアブル	250g 500g	-	晩腐病・褐斑病	3,000倍 33g	300ℓ 99g	いずれか
	アミスター10フロアブル	500ml	-	晩腐病・褐斑病	1,000倍 100ml	300ℓ 300ml	混用散布
	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	コガネムシ・ヨコバイ	2,000倍 50g	300ℓ 150g	
	コロマイト水和剤	500g	-	ハダニ類	2,000倍 50g	300ℓ 150g	単用散布

もも

1. 灰星病防除を徹底しましょう。
2. セン孔細菌病が前年多発した園では散布間隔を開けずに防除してください。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考	
6月上旬	トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-	せん孔細菌病	500倍 200ml	400ℓ 800ml	展着剤は加用しない	
	デランフロアブル	500ml	○	黒星病・灰星病	600倍 166ml	400ℓ 666ml		
	ウメシロカイヤラムシ重点防除							
	オリーブワンフロアブル	250ml	-	黒星病	400倍 250ml	400ℓ 1ℓ	無袋	
6月中旬下旬	ナリアWDG	250g	-	灰星病・黒星病	2,000倍 50g・ml	400ℓ 200g・ml	有機リン剤	
	アミスター10フロアブル	500ml	-		1,000倍 100ml	400ℓ 400ml		
	※〔有機リン剤(殺虫剤)〕							
	サイアノックス水和剤	500g	-	カイガラムシ類	1,000倍 100g	400ℓ 400g		
	ダズバンドF	167g	○	セン孔細菌病	3,000倍 33g	400ℓ 133g		
	展着剤	500ml	-		5,000倍 20ml	400ℓ 80ml		
	サルファーゾル	1ℓ	-	黒星病	400倍 250ml	400ℓ 1ℓ		
	デランフロアブル	500ml	○	灰星病	600倍 166ml	400ℓ 666ml	いずれか	
	スコア顆粒水和剤	250g 335g	-		2,000倍 50g	400ℓ 200g	混用散布	
	ナリアWDG	250g	-		2,000倍 50g	400ℓ 220g		
トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-		500倍 200ml	400ℓ 800ml			
ダントツ水溶剤	125g 250g	-		2,000倍 50g	400ℓ 200g			
サムコルフロアブル10	200ml	-	シンクイムシ類	5,000倍 20ml	400ℓ 80ml	使い6月用すれ中旬をに		
アーデント水和剤	500g	-		1,000倍 100g	400ℓ 400g			
※〔有機リン剤〕								
ダニサラバフロアブル	500ml	-	ハダニ類	1,000倍 100ml	400ℓ 400ml	発生に応じ加用		
展着剤	500ml	-		5,000倍 20ml	400ℓ 80ml			

おうとう

※灰星病防除を徹底しましょう。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考	
6月上旬	アンビルフロアブル	500ml	-	灰星病	1,000倍 100ml	700ℓ 700ml		
	ナバレオン等晩生種							
	ロブラール500アクア	500ml	-	灰星病	1,500倍 67ml	700ℓ 466ml	いずれか	
	パスワード顆粒水和剤	500g	-		1,000倍 100g	700ℓ 700g	混用散布	
	スタークル顆粒水溶剤	250g 500g	-	カヌムシ類	2,000倍 50g	700ℓ 350g		
	ダニサラバフロアブル	500ml	-	ハダニ類	1,000倍 100ml	700ℓ 700g	発生に応じ加用	
	ロブラール500アクア	500ml	-		1,500倍 67ml	500ℓ 335ml	いずれか	
6月中旬下旬	アフェットフロアブル	500ml	-	灰星病	2,000倍 50ml	500ℓ 250ml		
	ナリアWDG	250g	-		2,000倍 50g	500ℓ 250g		
	インダーフロアブル	100ml	-		5,000倍 20ml	500ℓ 100ml		
	アディオフロアブル	500ml	-	ショウジョウバエ	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml		
	テルスターフロアブル	100ml	○	ハダニ類	4,000倍 25ml	700ℓ 175ml	いずれか	
ダントツ水溶剤	125g 250g	-	ショウジョウバエ	2,000倍 50g	700ℓ 350g			

※アミスター10FLはりんごの一部品種(あかね等)では薬害が生じるので、飛散等により散布液がからないよう注意する。

かき

アザミウマの重点防除時期です。落葉病の防除も重要な時期です。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬(開花直前)	テルスター水和剤	500g	-	アザミウマ	1,000倍 100g	500ℓ 500g	いずれか
	ジェイエース水溶剤	100g 500g	-	カキノヘタムシガ	1,000倍 100g	500ℓ 500g	混用散布
	トップジンM水和剤	250g 500g	-		1,500倍 67g	500ℓ 334g	いずれか
	ベンコゼブ水和剤	250g 500g	-	落葉病	600倍 166g	500ℓ 830g	
アミスター10フロアブル	500ml	-		1,000倍 100g	500ℓ 500g		
6月中旬	スプラサイド水和剤	500g	○	アザミウマ	1,000倍 100g	500ℓ 500g	
6月下旬	有機殺菌剤			落葉病	6月上旬の有機殺菌剤参照		
	有機殺菌剤			落葉病			
6月下旬	ジェイエース水溶剤	100g 500g	-	チャノキイロアザミウマ	1,000倍 100g	500ℓ 500g	