

6月の農薬

No. 3 - 1

平成27年6月1日

農薬の使用量が多くなる時期です。農薬の適正使用を徹底しましょう。

水 稲

葉いもちや発病前の予防防除が重要です。補植用の残り苗は「葉いもち」の伝染源になるので、ただちに処分して下さい。いもち病予防のための粒剤・パック剤は発病前に遅れないよう処理して下さい。

時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	使用方法、使用量		
6月上旬～下旬	トレボン粒剤	2kg	-	イネミズゾウムシ(イネドロオイムシ)	施用は湛水して行き3日間は落水しない。シクロパックを使用する時は、5cm程度に湛水する。		
	シクロパック粒剤	600g(60g×10コ)	-				
	トレボン粉剤DL	3kg	-				
	MR.ジョーカーEW	500ml	-			フタオビコヤガ	
6月中旬	オリゼメート粒剤 コラトップ粒剤5 ブイゲット粒剤	3kg	-	育苗箱処理剤を田植時に処理した場合は不要	6月15～20日頃に1kg、3kg/10a湛水して散布する。		
	ルーチン粒剤	1kg	-				
	コラトップジャンボP	50g×10パック	-				
6月中旬～下旬	オリブライ1キロ粒剤	1kg	-	葉いもち病(白葉枯病)	湛水状態(3～5cm)で均一に散布し、少なくとも4～5日間は湛水状態を保ち、かけ流しをしない。葉に褐点を生じる場合があるので所定の使用量を厳守するとともに、次の事項に注意する。 (1)葉いもちの初発の遅い地域または早生種に対しては、なるべく早い時期(出穂30日前頃まで)に使用する。 (2)中干し直後や急激な温度上昇がおこる気象条件下では、葉に褐点を生じやすいので注意する。		
	※嵐剤、オリブライ剤、アミスター剤は同一成分とみなし耐性菌出現防止のため連用は避ける。						
6月中旬～7月下旬	ダブルカット粉剤DL	3kg	-	葉いもち(早期発見につとめ、発生の初期に防除する。)	いずれかを3kg/10a散布する。		
	ラブサイド粉剤DL		-				
	ビーム粉剤DL		-				
	ブラシン粉剤DL		-				
	ノンプラス粉剤DL		-				
	ラブサイドフロアブル		-				
	ダブルカットフロアブル		-				
	ビームゾル		500ml			○	1,000倍(100ml/100ℓ)を10a当り120ℓ散布する。
	ブラシンフロアブル		-				
ノンプラスフロアブル	-						

水稲除草剤

初中期一発剤および中期剤の使用は、田植後15～25日に遅れないように散布しましょう。抵抗性アゼナ類ホタルイ等の多い地域は、中期剤との体系による防除を行きましょう。

(一発処理除草剤) 初期除草剤との体系による防除を基本とする。

時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象雑草	使用方法、使用量
田植後15日	コメット1キロ粒剤	1kg 10kg	-	ノビエ他、一年生雑草ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヘラオモダカ、多年生雑草	ノビエ2.5葉期を目処に散布する。(田植後15日頃)。 ※ノビエ2.5葉期以上の場合は、中期剤による防除を行う。
	トップガンGT1キロ粒剤75	1kg 10kg	-		
	トップガンフロアブル	500ml	-		

(中期剤・残草対策剤)

時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象雑草	使用方法、使用量
田植後15～20日	ワイドショット1キロ粒剤	1kg	-	ノビエ、マツバイ他一年生雑草ホタルイ、ウリカワミズガヤツリ、ヘラオモダカ	キュウリへの薬害が懸念され既存中期剤の使用を控えている地域でも使用可能。 粒剤は1kg/10a、ジャンボ剤は10a当たり20パックを投入する。養魚池周辺では魚毒性が強いので使用しない。止水7日間を徹底する。
	フォローアップ1キロ粒剤	1kg	-		
	マメットSM1キロ粒剤	1kg	-		
田植後20～25日	マメットSMジャンボ	50g×20パック	-		
	バサグラン粒剤	3kg	-	一年生広葉雑草ホタルイ、ウリカワミズガヤツリ、ヘラオモダカ	バサグラン剤はイネ科雑草には効果がない。散布前に落水し土壌が湿っている状態で散布し、3日間入水しない。3kg/10a 液剤は500～700mlを水70～100ℓ/10a散布。
田植後20～30日	バサグラン液剤	500ml	-		
	ワイドパワー粒剤	3kg	-		
	クリンチャーバスマE液剤	500ml	-	上記雑草プラスノビエ	ノビエ5葉期まで。1000ml/10a(水70～100ℓ)
	ワイドアタックSC	100ml	-		ノビエ5葉期まで。100ml/10a(水100ℓ)

(ノビエ残草対策)

6月下旬～7月上旬	クリンチャーEW	100ml	-	ノビエ	ノビエ5葉期まで。100ml/10a(水100ℓ)
	クリンチャージャンボ	50g×20パック	-		ノビエ3葉期まで。10a当たり20パックを投入する。少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、落水かけ流しはしない。
	クリンチャー1キロ粒剤	1kg	-		10a当たり、1kg散布でノビエ3葉期まで。1.5kg散布でノビエ4葉期まで。
	ヒエクリーン豆つぶ250	250g	-		ノビエ4葉期まで。省力処理剤
	ヒエクリーン1キロ粒剤	1kg	-		ノビエ4葉期まで。
	ヒエクッパ1キロ粒剤	1kg	-		ノビエ5葉期まで。その他サイズ、クログワイにも効果あり。(5～7cmまで)

※発生中のノビエのみに有効。

西洋なし

1. 輪紋病、胴枯病の重点防除時期です。
2. 他樹種への飛散のないように散布してください。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考	
6月上旬	※有機殺菌剤 オキシラン水和剤	500g 1kg	-	輪紋病	500倍 200g	450ℓ 900g	いずれかにハイコンを混ぜる	
	オキシンドー水和剤80	500g	-		1,200倍 83g	450ℓ 375g		
	インダーフロアブル	100ml	-	黒星病	5,000倍 20ml	400ℓ 80ml		
	テルスター水和剤	500g	-	(シンクイムシ) (ハマキムシ)	1,000倍 100g	450ℓ 450g		いずれか
	アディオオン水和剤	100g 250g	-	(ハダニ) アブラムシ類	2,000倍 50g	450ℓ 225g		
6月上旬・中旬	バイカルティまたはクレフノン加用※有機殺菌剤			輪紋病			いずれか	
	合成ピレスロイド テルスター水和剤	500g	-	ハマキムシ類 アブラムシ類 シンクイムシ類	1,000倍 100g	600ℓ 600g		
	ネオニコ スタークル顆粒水溶剤	100g 250g	-	シンクイムシ類 カメムシ類 アブラムシ類	2,000倍 50g	600ℓ 300g		
6月中～下旬	ダニサラバフロアブル	500ml	-	ハダニ類	1,000倍 100ml	450ℓ 450ml	発生に応じて加用	
6月下旬～7月下旬	※※有機リン剤加用ICボルドー412	5kg 10kg	-	輪紋病(胴枯病)	30倍 3.3kg	600ℓ 20kg	加用散布	
	無ボルドー地域 アミスター10フロアブル	500ml	-	輪紋病(黒斑星病)	1,000倍 100ml	600ℓ 600ml		
	ストロビドドライフロアブル	250g 500g	-		2,000倍 50g	600ℓ 300g		
	ナリアWDG	250g	-		2,000倍 50g	600ℓ 300g		
	※※有機リン剤 ダイアジノン水和剤34	500g	○	シンクイムシ類 ハマキムシ類 (アブラムシ)	1,000倍 100g	450ℓ 450g		
	サイアノックス水和剤	500g	-		1,000倍 100g	450ℓ 450g		
ダズバンDF	167g	○	3,000倍 33g		450ℓ 150g			

※ナリアWDGは西洋なし(ル・レクチェ)、ぶどう(ピオーネ)に薬害が出るので飛散しないように注意する。

・本資料は防除の一例です。気象条件や作物の生育状況をふまえ、県関係機関にご相談のうえ、現場に沿った適正な防除指導をお願いいたします。
・農薬は登録内容が変更になる場合がございます。使用前に再度登録内容をご確認のうえ、ご使用いただきますようお願いいたします。



もっと近くに。

全農山形県本部 生産資材部

お問い合わせの電話番号 023-634-8157

FAX番号 023-634-8182

農薬はJAマークの製品を!

先入れ先出しの励行を!

6月の農薬

No. 3 - 2

平成27年6月1日

農薬の飛散が起こらないよう細心の注意を払いましょう。

りんご

1. 胴腐らんを発見したら患部を削りとり、ペフラン塗布剤、またはトップジンMペーストを塗布する。
2. シンクイムシ類(ハリトシ)防除の重要な時期なので遅れないように散布しましょう。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考	
6月上旬 (落花25日後)	トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-	黒斑病 点 星 落 葉 病	500倍 200ml	550ℓ 1,100ml		
6月上旬 斑点落葉病重点防除	スコア顆粒水和剤	250g 335g	-	斑 点 落 葉 病	3,000倍 33g	700ℓ 233g	いずれか 加用	
	ロブラール水和剤	500g	-	斑 点 落 葉 病	1,500倍 67g	700ℓ 467g		
	オーソサイド水和剤80	500g	-	黒 褐 星 斑 病	800倍 125g	700ℓ 875g		
	トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-	す す 点 斑 病	500倍 200ml	700ℓ 1,400ml	いずれか 加用	
	サイアノックス水和剤	500g 1kg	-	ア ハ キ シ	1,000倍 100g	700ℓ 700g		
	スプラサイド水和剤	500g	○	ブ ラ キ ム シ ホ ム シ 類	1,500倍 67g	700ℓ 467g	いずれか 加用	
	テルスター水和剤	500g	-	ア ハ キ シ	1,000倍 100g	700ℓ 700g		
	アーデント水和剤	500g	-	ア ハ キ シ	1,000倍 100g	700ℓ 700g	いずれか 加用	
	ロディー水和剤	500g	○	ア ハ キ シ	1,000倍 100g	700ℓ 700g		
ダントツ水溶剤	125g 250g	-	シ ン ク イ ム シ 類	4,000倍 25g	700ℓ 175g	ネオ三		
6月下旬～7月上旬	ICボルドー412	5kg 10kg	-		20倍 5kg	700ℓ 35kg	いずれか 混用散布	
	オキシラン水和剤	500g 1kg 1.67kg	-	斑 点 落 葉 病	600倍 167g	700ℓ 1,167g		
	パスポート顆粒水和剤	500g	-	斑 点 落 葉 病	1,000倍 100g	700ℓ 700g		
	ストロビードライフフロアブル	250g 500g	-	す す 点 斑 病	2,000倍 50g	700ℓ 350g		
	ナリアWDG	250g	-	す す 点 斑 病	2,000倍 50g	700ℓ 350g		
	ベルコート水和剤	500g	-		1,000倍 100g	700ℓ 700g		
	オキシンドー水和剤80	500g	-	斑 点 落 葉 病	1,200倍 83g	700ℓ 583g		早生種に 薬害注意
	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	シ ン ク イ ム シ 類	4,000倍 25g	700ℓ 175g		いずれか
	テルスター水和剤	500g	-	シ ン ク イ ム シ 類	1,000倍 100g	700ℓ 700g		
ノーマルト乳剤	100ml 500ml	-	キ ン モ ン ホ ソ ガ キ ン モ ン ハ モ グ リ ガ	4,000倍 25ml	700ℓ 175ml	いずれか		
ダニサラバフロアブル	500ml	-	ハ ダ ニ 類	1,000倍 100ml	700ℓ 700ml			

※1 ストロビードライフフロアブルはおうとうでは薬害が生じる恐れがあるので、周辺にある場合はかからないよう注意する。

※2 ナリアWDGは、西洋なし(ル・レクチェ)・ぶどう(ピオーネ)に薬害が出るので飛散しないように注意する。

ぶどう

1. 灰色かび防除は1回目のジベ処理後、3～4日後が適期です。
2. 2回目ジベ処理は、満開10日後頃です。遅れないように！

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬 大粒種 デラウェア第一回ベ処理3日後	テーク水和剤	250g	-	晩 色 腐 か と び 病	1,000倍 100g	300ℓ 300g	いずれか
	オーソサイド水和剤80	500g	-	晩 色 腐 か と び 病	1,000倍 100g	300ℓ 300g	
	ベンコゼブフロアブル	500ml	-	べ と 腐 う 病	1,000倍 100ml	300ℓ 300ml	いずれか
	ホライズンドライフフロアブル	200g	-	べ と 腐 う 病	2,500倍 40g	300ℓ 120g	
	スイッチ顆粒水和剤	500g	-	灰 色 腐 か と び 病	2,000倍 50g	300ℓ 150g	
ICボルドー66D	5kg	-	晩 色 腐 か と び 病	40倍 2.5kg	300ℓ 7.5kg		
6月上旬 (開花直前)	ジベレリン	粉末	200mg (大管1本)	2 回 目 処 理	濃 度	75～100ppm	ヨコバイが多いときはアドマイヤー水和剤1,000倍
		濃 度	80ppm 100ppm				
		粉末大管200mg当り水量	2.5ℓ 2ℓ				
錠剤	25mg (一錠)		錠剤25mg当り水量	310cc 250cc			
6月中旬 デラウェア	ベストガード水溶剤	100g 500g	-	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ (クロヒメゾウムシ)	2,000倍 50g	300ℓ 150g	ヨコバイが多いときはアドマイヤー水和剤1,000倍
	アーデント水和剤		-		1,000倍 100g	300ℓ 300g	
	コロマイト水和剤	100g 500g	-	ハ ダ ニ 類	2,000倍 50g	300ℓ 150g	

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月中下旬	オーソサイド水和剤80	500g	-	晩 腐 病	800倍 125g	250ℓ 312g	デラウェア
	ストロビードライフフロアブル	250g 500g	-	晩 腐 病・黒 と 斑 病	3,000倍 33g	300ℓ 100g	いずれか 混用散布
	アミスター10フロアブル	500ml	-	晩 腐 病・黒 と 斑 病	1,000倍 100ml	300ℓ 300ml	
	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	コ ガ ネ ム シ 類 フ タ テ ン ヒ メ ヨ コ バ イ	2,000倍 50g	300ℓ 150g	単用散布
	コロマイト水和剤	500g	-	ハ ダ ニ 類	2,000倍 50g	300ℓ 150g	

もも

1. 灰星病防除を徹底しましょう。
2. せん孔細菌病が前年多発した園では散布間隔を開けずに防除してください。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬 せん孔細菌病対策	トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-	せ ん 孔 細 菌 病	500倍 200ml	400ℓ 800ml	展着剤は加用しない
	デランフロアブル	500ml	○	せ ん 孔 細 菌 病	600倍 167ml	400ℓ 667ml	
6月上旬 ウメシロカイガラムシ重点防除	サルファーゾル	1ℓ	-	黒 星 病	400倍 250ml	400ℓ 1ℓ	無袋 と有機リン剤
	オンリーワンフロアブル	250ml	-		2,000倍 50g・ml	400ℓ 200g・ml	有袋
	ナリアWDG	250g	-	灰 星 病・黒 星 病			
	アミスター10フロアブル	500ml	-		1,000倍 100ml	400ℓ 400ml	
	※〔有機リン剤(殺虫剤)〕						
6月中下旬	サイアノックス水和剤	500g	-	カ イ ガ ラ ム シ 類	1,000倍 100g	400ℓ 400g	いずれか 混用散布
	ダズバンDF	167g	○	カ イ ガ ラ ム シ 類 (モ モ ハ モ グ リ ガ)	3,000倍 33g	400ℓ 133g	
	サルファーゾル	1ℓ	-	黒 星 病	400倍 250ml	400ℓ 1ℓ	
	デランフロアブル	500ml	○	灰 星 病	600倍 167ml	400ℓ 667ml	
	スコア顆粒水和剤	250g 335g	-	灰 星 病	2,000倍 50g	400ℓ 200g	
	ナリアWDG	250g	-	灰 星 病	2,000倍 50g	400ℓ 200g	
	トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-	灰 星 病	500倍 200ml	400ℓ 800ml	
	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	シ ン ク イ ム シ 類	2,000倍 50g	400ℓ 200g	
	サムコルフロアブル10	200ml	-	シ ン ク イ ム シ 類 (モ モ ハ モ グ リ ガ)	5,000倍 20ml	400ℓ 80ml	
アーデント水和剤	500g	-	シ ン ク イ ム シ 類	1,000倍 100g	400ℓ 400g		
※〔有機リン剤〕							
ダニサラバフロアブル	500ml	-	ハ ダ ニ 類	1,000倍 100ml	400ℓ 400ml	発生に応じて加用	

おうとう

※灰星病防除を徹底しましょう。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考		
6月上旬	アンビルフロアブル	500ml	-	灰 星 病	1,000倍 100ml	700ℓ 700ml	いずれか 混用散布		
	ナポレオン等晩生種								
	ロブラール500アクア	500ml	-	灰 星 病	1,500倍 67ml	700ℓ 467ml			
	パスワード顆粒水和剤	500g	-	灰 星 病	1,000倍 100g	700ℓ 700g			
	スタークル顆粒水溶剤	250g 500g	-	カ メ ム シ 類 オ ウ ト ウ シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ	2,000倍 50g	700ℓ 350g			
6月中下旬	ダニサラバフロアブル	500ml	-	ハ ダ ニ 類	1,000倍 100g	700ℓ 700g	発生に応じ加用		
	ロブラール500アクア	500ml	-	灰 星 病	1,500倍 67ml	500ℓ 333ml			
	ナリアWDG	250g	-	灰 星 病	2,000倍 50g	500ℓ 250g			
	インダーフロアブル	100ml	-	灰 星 病	5,000倍 20ml	500ℓ 100ml			
	アディオフロアブル	500ml	-	シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ (着 色 期 以 降)	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml			
テルスターフロアブル	100ml	○	ハ ダ ニ 類 シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ	4,000倍 25ml	700ℓ 175ml	いずれか			
ダントツ水溶剤	125g 250g	-	オ ウ ト ウ シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ	2,000倍 50g	700ℓ 350g				

※アミスター10FLはりんごの一部品種(あかね等)では薬害が生じるので、飛散等により散布液がかからないよう注意する。

※ロブラール500アクアの連用は、果面が汚れることがあるのでいずれか1回の使用とする。

かき

アザミウマの重点防除時期です。落葉病の防除も重要な時期です。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬 (開花直前)	テルスター水和剤	500g	-	チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ カキノヘタムシガ	1,000倍 100g	500ℓ 500g	いずれか 混用散布
	ジェイエース水溶剤	100g 500g	-	チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ カキノヘタムシガ	1,000倍 100g	500ℓ 500g	
	トップジンM水和剤	250g 500g	-		1,500倍 67g	500ℓ 333g	いずれか
	ベンコゼブ水和剤	500g 1kg	-	落 葉 病	600倍 167g	500ℓ 833g	
	アミスター10フロアブル	500ml	-		1,000倍 100ml	500ℓ 500ml	
6月中旬	スプラサイド水和剤	500g	○	ア ザ ミ ウ マ	1,000倍 100g	500ℓ 500g	
6月下旬	上記殺菌剤			落 葉 病	6月上旬の上記殺菌剤参照		
	上記殺菌剤			落 葉 病	6月上旬の上記殺菌剤参照		
6月下旬	ジェイエース水溶剤	100g 500g	-	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	1,000倍 100g	500ℓ 500g	