

6月の農薬

No. 3 - 1

平成29年6月1日

農薬の使用量が多くなる時期です。農薬の適正使用を徹底しましょう。

水稲

葉いもち発病前の予防防除が重要です。補植用の残り苗は「葉いもち」の伝染源になるので、ただちに処分して下さい。いもち病予防のための粒剤・パック剤は発病前に遅れないよう処理して下さい。

時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	使用方法、使用量
6月上旬～下旬	トレボン粒剤	2kg	-	イネミズゾウムシ(イネドロオイムシ)	施用は灌水して行き3日間は落水しない。シクロパックを使用する時は、5cm程度に灌水する。
	シクロパック粒剤	600g (60g×10コ)	-		
	トレボン粉剤DL	3kg	-	3kg/10a	
	MR.ジョーカーEW	500ml	-	フタオピコヤガ	2,000倍 6月下旬～7月上旬が散布適期
6月中旬	オリゼメート粒剤 コラトップ粒剤5 ブイゲット粒剤	3kg	-	葉いもち病(白葉枯病)	6月15～20日頃に1kg、3kg/10a灌水して散布する。
	ルーチン粒剤	1kg	-		
	コラトップジャンボP	50g×10パック	-		
6月中旬～7月下旬	ダブルカット粉剤3DL	-	-	葉いもち(早期発見につとめ、発生の初期に防除する。)	いずれかを3kg/10a散布する。
	ラブサイド粉剤DL	-	-		
	ビーム粉剤DL	3kg	-		
	ブラシン粉剤DL	-	-		
	ノンプラス粉剤DL	-	-		
	ラブサイドフロアブル	-	-		
	ダブルカットフロアブル	-	-		
	ビームゾル	500ml	○		
ブラシンフロアブル	-	-			
ノンプラスフロアブル	-	-			

水稲除草剤

初中期一発剤および中期剤の使用は、田植後15～25日に遅れないように散布しましょう。抵抗性アゼナ類ホタルイ等の多い地域は、中期剤との体系による防除を行いましょう。

(一発処理除草剤) 初期除草剤との体系による防除を基本とする。

時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象雑草	使用方法、使用量
田植後15日	コメット1キロ粒剤	1kg 10kg	-	ノビエ他、一年生雑草 ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヘラオモダカ、多年生雑草	ノビエ2.5葉期を目処に散布する。(田植後15日頃)。 ※ノビエ2.5葉期以上の場合は、中期剤による防除を行う。
	トップガンGT1キロ粒剤75	1kg 10kg	-		
	トップガンフロアブル	500ml	-		

(中期剤・残草対策剤)

時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象雑草	使用方法、使用量
田植後15～20日	ワイドショット1キロ粒剤	1kg 10kg	-	ノビエ、マツバイ他一年生雑草 ホタルイ、ウリカワ ミズガヤツリ、ヘラオモダカ オモダカ	キュウリへの薬害が懸念され既存中期剤の使用を控えている地域でも使用可能。 粒剤は1kg/10a、ジャンボ剤は10a当たり20パックを投入する。 養魚池周辺では魚毒性が強いので使用しない。止水7日間を徹底する。
田植後20～25日	レプラス1キロ粒剤	1kg	-		
	セカンドショットSジャンボMX	25g×20パック	-		
	マメットSM1キロ粒剤	1kg	-		
田植後20～30日	マメットSMジャンボ	50g×20パック	-	一年生広葉雑草 ホタルイ、ウリカワ ミズガヤツリ、ヘラオモダカ	バサグラン剤はイネ科雑草には効果がない。散布前に落水し土壌が湿っている状態で散布し、3日間入水しない。 3kg/10a 液剤は500～700mlを水70～100ℓ/10a散布。 ノビエ5葉期まで。 1000ml/10a(水70～100ℓ) ノビエ5葉期まで。 100ml/10a(水100ℓ)
	バサグラン粒剤	3kg 9kg	-		
	バサグラン液剤	500ml	-		
	ワイドパワー粒剤	3kg	-		
	クリンチャーバスマE液剤	500ml	-		
ワイドアタックSC	100ml	-			

(ノビエ残草対策)

6月下旬～7月上旬	クリンチャーEW	100ml	-	ノビエ	ノビエ5葉期まで。 100ml/10a(水100ℓ)
	クリンチャージャンボ	50g×20パック	-		ノビエ3葉期まで。 10a当たり20パックを投入する。 少なくとも3～4日間は灌水状態を保ち、落水かけ流しはしない。
	クリンチャー1キロ粒剤	1kg	-		10a当たり、1kg散布でノビエ3葉期まで。 1.5kg散布でノビエ4葉期まで。
	ヒエクリーン豆つぶ250	250g	-		ノビエ4葉期まで。省力処理剤
	ヒエクリーン1キロ粒剤	1kg	-		ノビエ4葉期まで。
	ヒエクッパ1キロ粒剤	1kg	-		ノビエ5葉期まで。その他シズイ、クログワイにも効果あり。(5～7cmまで)

西洋なし

1. 輪紋病、胴枯病の重点防除時期です。
2. 他樹種への飛散のないように散布してください。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬	※有機殺菌剤 オキシラン水和剤	500g 1kg	-	輪紋病	500倍 200g	450ℓ 900ℓ	いずれかにハイコンを加える いずれか 加用散布
	オキシンドー水和剤80	500g	-		1,200倍 83g	450ℓ 375ℓ	
	インダーフロアブル	100ml	-	黒星病	5,000倍 20ml	400ℓ 80ml	
	スカウトフロアブル	100ml 500ml	○	(シンクイムシ) (ハマキムシ)	2,000倍 50ml	450ℓ 225g	
	アディオン水和剤	100g 250g	-	アブラムシ類	2,000倍 50g	450ℓ 225g	
	6月上旬・中旬	バイカルティまたはクレフノン加用※有機殺菌剤	-	-	輪紋病	-	
合成ピレスロイド スカウトフロアブル		100ml 500ml	○	シンクイムシ類 アブラムシ類 カメムシ類	2,000倍 50ml	600ℓ 300ml	
ネオニコ バリアード顆粒水和剤		100g 250g	-		4,000倍 25g	600ℓ 150ml	
6月中～下旬	スターマイトフロアブル	250ml	-	ハダニ類	2,000倍 50ml	600ℓ 300ml	発生に応じて加用
6月下旬～7月下旬	※※有機リン剤加用ICボルドー412	5kg 10kg	-	輪紋病(胴枯病)	30倍 3.3kg	600ℓ 20kg	加用散布
	無ボルドー地域 アミスター10フロアブル	500ml	-	輪紋病 黒斑病 (黒星病)	1,000倍 100ml	600ℓ 600ml	
	ストロビドドライフロアブル	250g 500g	-		2,000倍 50g	600ℓ 300g	
	ナリアWDG	250g	-		2,000倍 50g	600ℓ 300g	
	※※有機リン剤 ダイアジノン水和剤34	500g	○	シンクイムシ類 ハマキムシ類 (アブラムシ)	1,000倍 100g	600ℓ 600g	
	サイアノックス水和剤	500g	-		1,000倍 100g	600ℓ 600g	
ダースバンDF	167g	○	3,000倍 33g		600ℓ 200g		

※ナリアWDGは西洋なし(ル・レクチェ)、ぶどう(ピオーネ)に薬害が出るので飛散しないように注意する。

・本資料は防除の一例です。気象条件や作物の生育状況をふまえ、県関係機関にご相談のうえ、現場に沿った適正な防除指導をお願いいたします。
・農薬は登録内容が変更になる場合がございます。使用前に再度登録内容をご確認のうえ、ご使用いただきますようお願いいたします。



もっと近くに。

全農山形県本部 生産資材部

お問い合わせの電話番号 023-634-8157

FAX番号 023-634-8182

農薬はJAマークの製品を!

先入れ先出しの励行を!

6月の農薬

No. 3 - 2

平成29年6月1日

農薬の飛散が起こらないよう細心の注意を払いましょう。

りんご

1. 胴腐らんを発見したら患部を削りとり、ペフラン塗布剤、またはトップジンMペーストを塗布する。
2. シンクイムシ類(ハリトーチ)防除の重要な時期なので遅れないように散布しましょう。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬 (落花25日後)	トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-	黒斑黒点 星落葉 葉病	500倍 200ml	550ℓ 1,100ml	
6月上旬 斑点落葉病重点防除	スコア顆粒水和剤	250g 335g	-	斑う黒点 落ん星 葉こ	3,000倍 33g	700ℓ 233g	いずれか 加用
	ロブラール水和剤	500g	-	斑点落葉病	1,500倍 67g	700ℓ 467g	
	オーソサイド水和剤80	500g	-	黒褐星斑	800倍 125g	700ℓ 875g	いずれか
	トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-	すすすす 点斑	500倍 200ml	700ℓ 1,400ml	
	サイアノックス水和剤	500g 1kg	-		1,000倍 100g	700ℓ 700g	有機リン剤
	スプラサイド水和剤	500g	○		1,500倍 67g	700ℓ 467g	
	テルスター水和剤	500g	-	アハキシ ブマン ラキモク	1,000倍 100g	700ℓ 700g	合成ピレスロイド剤
	アーデント水和剤	500g	-		2,000倍 50ml	700ℓ 350ml	
	スカウトフロアブル	100ml 500ml	○		4,000倍 25g	700ℓ 175g	ネオニコチノイド剤
	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	シキリ ンクイムシ ンホモ シカシ	20倍 5kg	700ℓ 35kg	
6月下旬～7月上旬	ICボルドー412	5kg 10kg	-		600倍 167g	700ℓ 1,167g	いずれか
	オキシラン水和剤	500g 1kg 1.67kg	-	斑黒褐黒 すす すす	1,000倍 100g	700ℓ 700g	
	バスポート顆粒水和剤	500g	-		2,000倍 50g	700ℓ 350g	いずれか
	ナリアWDG	250g	-		1,000倍 100g	700ℓ 700g	
	ベルコート水和剤	500g	-		1,200倍 83g	700ℓ 583g	早生種に 薬害注意
	オキシンドー水和剤80	500g	-	斑黒すす すす 点斑	4,000倍 25g	700ℓ 175g	
	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	シンクイムシ ンホモ シカシ	1,000倍 100g	700ℓ 700g	いずれか
	テルスター水和剤	500g	-	キンモンハモグリガ	4,000倍 25ml	700ℓ 175ml	
6月中旬～下旬	スターマイトフロアブル	250ml	-	ハダニ類	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml	

※1 ナリアWDGは、西洋なし(ル・レクチェ)・ぶどう(ピオーネ)に薬害が出るので飛散しないように注意する。

ぶどう

1. 灰色かび防除は1回目のジベ処理後、3～4日後が適期です。
2. 2回目ジベ処理は、満開10日後頃です。遅れないように！

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬 大粒種 デラウェア第一回ジベ処理3日後	テーク水和剤	250g	-	晩灰色 腐かび	1,000倍 100g	300ℓ 300g	いずれか
	オーソサイド水和剤80	500g	-		1,000倍 100g	300ℓ 300g	
	ベンコゼブフロアブル	500ml	-	べ晩黒 と腐う	1,000倍 100ml	300ℓ 300ml	いずれか
	ホライズンドライフロアブル	200g	-	べと	2,500倍 40g	300ℓ 120g	
	スイッチ顆粒水和剤	500g	-	灰晩色 か腐び	2,000倍 50g	300ℓ 150g	
ICボルドー66D	5kg	-	晩べ	50倍 2kg	300ℓ 6kg		
6月中旬 デラウェア	ジベレリン	粉末 200mg (大管1本)	-	2回目処理	濃度 75～100ppm 濃度 80ppm 100ppm 粉末大管200mg当り水量 2.5ℓ 2ℓ 錠剤25mg当り水量 310cc 250cc		
	ベストガード水溶剤	100g 500g	-	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ (クロヒメゾウムシ)	2,000倍 50g	300ℓ 150g	ヨコバイが多いときはアドマイヤー水和剤1,000倍
	アーデント水和剤	100g 500g	-		1,000倍 100g	300ℓ 300g	
6月中旬	コロマイト水和剤	100g 500g	-	ハダニ類	2,000倍 50g	300ℓ 150g	

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月中旬下旬	オーソサイド水和剤80	500g	-	晩腐病	800倍 125g	250ℓ 312g	デラウェア
	ストロビードライフロアブル	250g 500g	-	晩腐病・褐斑病 べと病・黒とう	3,000倍 33g	300ℓ 100g	いずれか 混用散布
	アミスター10フロアブル	500ml	-		1,000倍 100ml	300ℓ 300ml	
	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	コガネムシ類 フタテンヒメヨコバイ	2,000倍 50g	300ℓ 150g	
6月中旬下旬	コロマイト水和剤	100g 500g	-	ハダニ類	2,000倍 50g	300ℓ 150g	単用散布

もも

1. 灰星病防除を徹底しましょう。
2. せん孔細菌病が前年多発した園では散布間隔を開けずに防除してください。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬 せん孔細菌病対策	トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-	せん孔細菌病	500倍 200ml	400ℓ 800ml	展着剤は加用しない
	デランフロアブル	500ml	○	黒星病・灰星病	600倍 167ml	400ℓ 667ml	
6月上旬 ウメシロカイガラムシ重点防除	サルファーゾル	1ℓ	-	黒星病	400倍 250ml	400ℓ 1ℓ	無袋 と有機リン散布剤
	オンリーワンフロアブル	250ml	-		2,000倍 50g・ml	400ℓ 200g・ml	有袋
	ナリアWDG	250g	-	灰星病・黒星病	1,000倍 100ml	400ℓ 400ml	
	アミスター10フロアブル	500ml	-				
6月中旬下旬	※〔有機リン剤(殺虫剤)〕						
	ダイアジノン水和剤34	250g	○	カイガラムシ類 シンクイムシ類 (モモハモグリガ)	1,500倍 67g	400ℓ 268g	いずれか 混用散布
	ダーズバンドF	167g	○		3,000倍 33g	400ℓ 133g	
	サルファーゾル	1ℓ	-	黒星病	400倍 250ml	400ℓ 1ℓ	いずれか
	デランフロアブル	500ml	○		600倍 167ml	400ℓ 667ml	
	スコア顆粒水和剤	250g 335g	-	灰星病	2,000倍 50g	400ℓ 200g	いずれか 混用散布
ナリアWDG	250g	-		2,000倍 50g	400ℓ 200g		
トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-		500倍 200ml	400ℓ 800ml	散い6 布ず月 する中 か旬を	
ダントツ水溶剤	125g 250g	-	シンクイムシ類 モモハモグリガ	2,000倍 50g	400ℓ 200g		
サムコルフロアブル10	200ml	-		5,000倍 20ml	400ℓ 80ml	散い6 布ず月 する中 か旬を	
アーデント水和剤	500g	-		1,000倍 100g	400ℓ 400g		
6月中旬下旬	スターマイトフロアブル	250ml	-	ハダニ類	2,000倍 50ml	400ℓ 200ml	

おうとう

※灰星病防除を徹底しましょう。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬	アンピルフロアブル	500ml	-	灰星病	1,000倍 100ml	700ℓ 700ml	いずれか 混用散布
	ナボレオン等晩生種						
	ロブラール500アクア	500ml	-	灰星病	1,500倍 67ml	700ℓ 467ml	いずれか
	パスワード顆粒水和剤	500g	-		1,000倍 100g	700ℓ 700g	
	スタークル顆粒水溶剤	250g 500g	-	カメムシ類 オウトウショウジョウバエ	2,000倍 50g	700ℓ 350g	いずれか
	ディアナWDG	100g	-	オウトウショウジョウバエ	10,000倍 10g	700ℓ 70g	
	スターマイトフロアブル	250ml	-	ハダニ類	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml	
6月中旬下旬	ロブラール500アクア	500ml	-	灰星病	1,500倍 67ml	500ℓ 333ml	いずれか
	ナリアWDG	250g	-		2,000倍 50g	500ℓ 250g	
	インダーフロアブル	100ml	-		5,000倍 20ml	500ℓ 100ml	
	アディオフロアブル	500ml	-	ショウジョウバエ (着色期以降)	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml	いずれか
	テルスターフロアブル	100ml	○	ハダニ類 ショウジョウバエ類	4,000倍 25ml	700ℓ 175ml	
6月中旬下旬	エクシレルSE	200ml 500ml	-	オウトウショウジョウバエ	2,500倍 40ml	700ℓ 280ml	

※ロブラール500アクアの連用は、果面が汚れることがあるのでいずれか1回の使用とする。

かき

アザミウマの重点防除時期です。落葉病の防除も重要な時期です。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬 (開花直前)	テルスター水和剤	500g	-	チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ カキノヘタムシガ	1,000倍 100g	500ℓ 500g	いずれか 混用散布
	ジェイエース水溶剤	100g 500g	-		1,500倍 67g	500ℓ 333g	
	トップジンM水和剤	250g 500g	-		1,500倍 67g	500ℓ 333g	いずれか
	ベンコゼブ水和剤	500g 1kg	-	落葉病	600倍 167g	500ℓ 833g	
	アミスター10フロアブル	500ml	-		1,000倍 100ml	500ℓ 500ml	
6月中旬	スプラサイド水和剤	500g	○	アザミウマ	1,000倍 100g	500ℓ 500g	
6月中旬	上記殺菌剤			落葉病			6月上旬の上記殺菌剤参照
6月中旬	上記殺菌剤			落葉病			
6月下旬	ジェイエース水溶剤	100g 500g	-	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	1,500倍 67g	500ℓ 333g	