

6月の農薬

No. 3 - 1

令和3年6月1日

農薬の使用量が多くなる時期です。農薬の適正使用を徹底しましょう。

水稲

葉いもちや発病前の予防防除が重要です。補植用の残り苗は「葉いもち」の伝染源になるので、ただちに処分して下さい。いもち病予防のための粒剤・パック剤は発病前に遅れないよう処理して下さい。

時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	使用方法、使用量	
6月上旬～下旬	トレボン粒剤	2kg	-	イネミズゾウムシ (イネドロオイムシ)	施用は湛水して行い3日間は落水しない。 3kg/10a	
	トレボン粉剤DL	3kg	-			
	MR.ジョーカーEW	500ml	-	フタオピコヤガ	2,000倍 6月下旬～7月上旬が散布適期	
6月中旬	オリゼメート粒剤 コラトップ粒剤5	3kg	-	葉いもち病 (白葉枯病)	6月15～20日頃に1kg、3kg/10a湛水して散布する。 パック剤は、3cm以上湛水し散布する。藻や表層はく離が発生している水田では使用しない。コラトップジャンボPは、10～13パック/10aを投入する。	
	コラトップジャンボP	50g×10パック	-			
6月中旬～7月下旬	ダブルカット粉剤3DL	-	-	葉いもち	いずれかを3kg/10a散布する。	
	ラブサイド粉剤DL	-	-			
	ビーム粉剤DL	3kg	-			
	ブラシン粉剤DL	-	-			
	ノンプラス粉剤DL	-	-			
	ラブサイドフロアブル	-	-			[早期発見につとめ、発生の初期に防除する。]
	ダブルカットフロアブル	-	-			
	ビームゾル	500ml	○			1,000倍(100ml/100ℓ)を10a当たり120ℓ散布する。
	ブラシンフロアブル	-	-			
ノンプラスフロアブル	-	-				

水稲除草剤

初中期一発剤および中期剤の使用は、田植後10～25日に遅れないように散布しましょう。抵抗性アゼナ類ホタルイ等の多い地域は、中期剤との体系による防除を行きましょう。

(一発処理除草剤) 初期除草剤との体系による防除を基本とする。

時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象雑草	使用方法、使用量
田植後15日	アシュラ1キロ粒剤	1kg 10kg	-	ノビエ他、一年生雑草 ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヘラオモダカ、多年生雑草	ノビエ2.5葉期を目処に散布する。(田植後15日頃)。 ※ノビエ3.5葉期以上の場合は、中期剤による防除を行う。
	ブライオリティ1キロ粒剤	1kg 10kg	-		
	カウントダウンフロアブル	500ml	-		

(中期剤・残草対策剤)

時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象雑草	使用方法、使用量
田植後15～20日	ワイドショット1キロ粒剤	1kg 10kg	-	ノビエ、マツバイ他一年生雑草 ホタルイ、ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ	粒剤は1kg/10a、ジャンボ剤は10パック/10aを投入する。
田植後20～25日	レプラス1キロ粒剤	1kg 10kg	-		
	レプラスジャンボ	40g×10パック	-		
田植後20～30日	マメットSM1キロ粒剤	1kg	-	一年生広葉雑草 一年生ウリカワ 一年生ミズガヤツリ 一年生ヘラオモダカ	粒剤は1kg/10a、ジャンボ剤は10a当たり20パックを投入する。 養魚池周辺では魚毒性が強いので使用しない。止水7日間を徹底する。
	マメットSMジャンボ	50g×20パック	-		
	バサグラン粒剤	3kg 9kg	-		
	バサグラン液剤	500ml	-		
	ワイドパワー粒剤	3kg	-		
	クリンチャーバスメ液剤	500ml	-		
田植後20～30日	ワイドアタックSC	100ml	-	上記雑草プラスノビエ	ノビエ5葉期まで。 1000ml/10a(水70～100ℓ) ノビエ5葉期まで。 100ml/10a(水100ℓ) ノビエ6葉期まで。 1000ml/10a(水100ℓ)
	トドメバスメ液剤	500ml	-		

(ノビエ残草対策)

6月下旬～7月上旬	クリンチャーEW	100ml	-	ノビエ	ノビエ6葉期まで。 100ml/10a(水100ℓ)
	クリンチャージャンボ	50g×20パック	-		ノビエ4葉期まで。 10a当たり30パックを投入する。 少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、落水かけ流しはしない。
	クリンチャー1キロ粒剤	1kg	-		10a当たり、1kg散布でノビエ4葉期まで。1.5kg散布でノビエ5葉期まで。
	ヒエクリーン豆つぶ250	250g	-		ノビエ4葉期まで。省力処理剤
	ヒエクリーン1キロ粒剤	1kg	-		ノビエ4葉期まで。
	トドメMF1キロ粒剤	1kg	-		ノビエ5葉期まで。
	トドメMF乳剤	200ml	-		ノビエ7葉期まで。 200ml/10a(水100ℓ)

西洋なし

1. 輪紋病、胴枯病の重点防除時期です。
2. 他樹種への飛散のないように散布してください。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り量	10a当り散布量	備考
6月上旬	※有機殺菌剤 オキシラン水和剤	500g	-	輪紋病	500倍	450ℓ	いずれか加用散布
		1.67kg	-		200g	900g	
	オキシンドー水和剤80	500g	-		1,200倍	450ℓ	
		835g	-		83g	375g	
6月上旬・中旬	スクレアフロアブル	166ml 250ml	-	胴輪枯病	3,000倍	450ℓ	いずれか
	スカウトフロアブル	100ml 500ml	○	(シンクイムシ) (ハマキムシ) アブラムシ類	2,000倍	450ℓ	
	バイカルティまたはクレフノン加用※有機殺菌剤	-	-	輪紋病	-	-	
6月上旬・中旬	合成ピレスロイド スカウトフロアブル	100ml	○	シンクイムシ類 アブラムシ類 カメムシ類	2,000倍	600ℓ	いずれか
		500ml	-		50ml	300ml	
6月中旬～下旬	ネオニコ バリアード顆粒水和剤	100g	○	ハダニ類	4,000倍	600ℓ	発生に応じて加用
		250g	-		25g	150ml	
6月下旬～7月下旬	ダニコングフロアブル	250ml	-	ハダニ類	2,000倍	600ℓ	いずれか混用散布
	パレード15フロアブル	250ml	-	輪黒紋斑星病(黒)	2,000倍	600ℓ	
	ナリアWDG	250g	-	輪黒紋斑星病(黒)	2,000倍	600ℓ	
	ダイアジノン水和剤34	500g	○	シンクイムシ類	1,000倍	600ℓ	
	サイアノックス水和剤	500g	-	ハマキムシ類 (アブラムシ)	1,000倍	600ℓ	
6月下旬～7月下旬	ダーズバンDF	167g	○	シンクイムシ類 (アブラムシ)	3,000倍	600ℓ	いずれか
					33g	200g	

※ナリアWDGは西洋なし(ル・レクチェ)、ぶどう(ピオーネ)に薬害が出るので飛散しないように注意する。

・本資料は防除の一例です。気象条件や作物の生育状況をふまえ、県関係機関にご相談のうえ、現場に沿った適正な防除指導をお願いいたします。
・農薬は登録内容が変更になる場合がございます。使用前に再度登録内容をご確認のうえ、ご使用いただきますようお願いいたします。



もっと近くに。

全農山形県本部 生産資材部

お問い合わせの電話番号 023-687-8700

FAX番号 023-634-8182

農薬はJAマークの製品を!

先入れ先出しの励行を!

6月の農薬

No. 3 - 2

令和3年6月1日

農薬の飛散が起こらないよう細心の注意を払いましょう。

りんご

1. 胴腐らんを発見したら患部を削りとり、ペフラン塗布剤、またはトップジンMペーストを塗布する。
2. シンクイムシ類(ハリトーチ)防除の重要な時期なので遅れないように散布しましょう。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬 (落花25日後)	オルフィンフロアブル	250ml	-	黒斑黒点星落葉病	4,000倍 25ml	600ℓ 150ml	
	ロブラール水和剤	100g 500g	-	斑点落葉病	1,500倍 67g	700ℓ 467g	
6月上葉病重点防除	パレード15フロアブル	250ml	-	褐斑点落葉病	2,000倍 50ml	700ℓ 350g	
	トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-	すすすす点斑病	500倍 200ml	700ℓ 1,400ml	
	スプラサイド水和剤	500g	○	アハキシン ブマンク ラキムシ ムシホソ	1,500倍 67g	700ℓ 467g	いずれかを加用
	スカウトフロアブル	100ml 500ml	○	シンクイムシ類	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml	
	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	シンクイムシ類	4,000倍 25g	700ℓ 175g	
	トランスフォームフロアブル	250ml	-	カイガラムシ類	3,000倍 33ml	450ℓ 150ml	
	ナリアWDG	250g	-	斑点落葉病	2,000倍 50g	700ℓ 350g	
ファンタジスタ顆粒水和剤	100g 166g 500g	-	すすすす点斑病	3,000倍 33g	700ℓ 233g		
オキシンドー水和剤80	500g 835g	-	斑点落葉病	1,200倍 83g	700ℓ 583g	いずれか	
エクシレルSE	200ml 500ml	-	シンクイムシ類	5,000倍 20g	700ℓ 140g		
スカウトフロアブル	100ml 500ml	○	シンクイムシ類	2,000倍 50g	700ℓ 350g		
6月中下旬	ダニコングフロアブル	250ml	-	ハダニ類	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml	

※1 ナリアWDGは、西洋なし(ル・レクチェ)・ぶどう(ピオーネ)に葉害が出るので飛散しないように注意する。

ぶどう

1. 灰色かび防除は1回目のジベ処理後、3~4日後が適期です。
2. 2回目ジベ処理は、満開10日後頃です。遅れないように！

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬 (第一回ジベ処理3日後)	スイッチ顆粒水和剤	500g	-	灰色かび病	2,000倍 50g	300ℓ 150g	いずれか
	ベンコゼブフロアブル	500ml	-	べと病	1,000倍 100ml	300ℓ 300ml	
	スイッチ顆粒水和剤	500g	-	灰色かび病	2,000倍 50g	300ℓ 150g	
	ICボルドー66D	5kg	-	晩べと病	50倍 2kg	300ℓ 6kg	
6月中旬	ジベレリン	粉末 200mg (大管1本)	-	2回目処理	濃度 75~100ppm 濃度 80ppm 100ppm 粉末大管200mg当り水量 2.5ℓ 2ℓ 錠剤25mg当り水量 310cc 250cc		
	錠剤	25mg (一錠)	-				
6月中旬	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ コガネムシ類	2,000倍 50g	300ℓ 150g	ヨコバイが多いときはアドマイヤー水和剤1,000倍
	コロマイト水和剤	100g 500g	-	ハダニ類	2,000倍 50g	300ℓ 150g	

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月中下旬	オーソサイド水和剤80	500g	-	晩腐病	800倍 125g	250ℓ 312g	デラウェア
	ストロビードライフロアブル	250g 500g	-	晩腐病・褐斑病	3,000倍 33g	300ℓ 100g	いずれか 混用散布
	アミスター10フロアブル	500ml	-	晩腐病・褐斑病	1,000倍 100ml	300ℓ 300ml	
	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	コガネムシ類	2,000倍 50g	300ℓ 150g	単用散布
	コロマイト水和剤	100g 500g	-	ハダニ類	2,000倍 50g	300ℓ 150g	

もも

1. 灰星病防除を徹底しましょう。
2. せん孔細菌病が前年多発した園では散布間隔を開けずに防除してください。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考	
6月上旬	デランフロアブル	500ml	○	せん孔細菌病	600倍 167ml	400ℓ 667ml		
	ウメシロカイガラムシ重点防除							
6月中下旬	サルファーゾル	1ℓ	-	黒星病	400倍 250ml	400ℓ 1ℓ	無袋	
	オンリーワンフロアブル	250ml	-	灰星病・黒星病	2,000倍 50g・ml	400ℓ 200g・ml	有袋	
	ナリアWDG	250g	-					
	※〔有機リン剤(殺虫剤)〕							
	ダイアジノン水和剤34	250g	○	カイガラムシ類	1,500倍 67g	400ℓ 268g		
	ダズバンDF	167g	○	シンクイムシ類	3,000倍 33g	400ℓ 133g		
	スコア顆粒水和剤	250g	-		2,000倍 50g	400ℓ 200g	いずれか 混用散布	
	ナリアWDG	250g	-	灰星病	2,000倍 50g	400ℓ 200g		
	デランフロアブル	500ml	○		600倍 167ml	400ℓ 667ml	いずれか 6月上旬の有機リン剤参照	
	ダントツ水溶剤	125g 250g	-		2,000倍 50g	400ℓ 200g		
エクシレルSE	200ml 500ml	-	シンクイムシ類	5,000倍 20ml	400ℓ 80ml			
スカウトフロアブル	100ml 501ml	○	モモハモグリガ	2,000倍 50ml	400ℓ 200ml			
※〔有機リン剤〕								
ダニコングフロアブル	250ml	-	ハダニ類	2,000倍 50ml	400ℓ 200ml			

おうとう

※灰星病防除を徹底しましょう。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考	
6月上旬	ナボレオン等晩生種							
	ロブラール500アクア	500ml	-	灰星病	1,500倍 67ml	700ℓ 467ml	いずれか 混用散布	
	パレード15フロアブル	250ml	-		2,000倍 50g	700ℓ 350ml		
	スタークル顆粒水溶剤	250g 500g	-	カメムシ類	2,000倍 50g	700ℓ 350g		
	ダニコングフロアブル	250ml	-	ハダニ類	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml		
6月中下旬	オンリーワンフロアブル	250ml	-		2,000倍 50ml	500ℓ 250ml	いずれか	
	ナリアWDG	250g	-	灰星病	2,000倍 50g	500ℓ 250g		
	インダーフロアブル	100ml	-		5,000倍 20ml	500ℓ 100ml	いずれか	
	テルスターフロアブル	100ml	○	ハダニ類	4,000倍 25ml	700ℓ 175ml		
エクシレルSE	200ml 500ml	-	オウトウショウジョウバエ	2,500倍 40ml	700ℓ 280ml			

※ロブラール500アクアの連用は、果面が汚れることがあるのでいずれか1回の使用とする。

かき

アザミウマの重点防除時期です。落葉病の防除も重要な時期です。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考	
6月上旬 (開花直前)	テルスター水和剤	500g	-	チャノキイロアザミウマ	1,000倍 100g	500ℓ 500g	いずれか 混用散布	
	ジェイエース水溶剤	100g 500g	-	カキクダアザミウマ	1,500倍 67g	500ℓ 333g		
	トップジンM水和剤	250g 500g	-	カキノヘタムシガ	1,500倍 67g	500ℓ 333g	いずれか	
	ベンコゼブ水和剤	500g 1kg	-	落葉病	600倍 167g	500ℓ 833g		
	アミスター10フロアブル	500ml	-		1,000倍 100ml	500ℓ 500ml		
6月中旬	スプラサイド水和剤	500g	○	アザミウマ	1,000倍 100g	500ℓ 500g		
6月下旬	上記殺菌剤							
	ジェイエース水溶剤	100g 500g	-	チャノキイロアザミウマ	1,500倍 67g	500ℓ 333g	6月上旬の上記殺菌剤参照	