

6月の農薬

No. 3 - 1
令和6年6月1日

農薬の使用量が多くなる時期です。農薬の適正使用を徹底しましょう。

水稲

葉いもちや発病前の予防防除が重要です。補植用の残り苗は「葉いもち」の伝染源になるので、ただちに処分して下さい。いもち病予防のための粒剤・パック剤は発病前に遅れないよう処理して下さい。

時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	使用方法、使用量	
6月上旬～下旬	トレボン粒剤	2kg	-	イネミズゾウムシ(イネドロオイムシ)(イナゴ)	施用は湛水して行き3日間は落水しない。	
	トレボン粉剤DL	3kg	-		3kg/10a ※粉剤のみフタオビコヤガ発録あり	
6月中旬	オリゼメート粒剤 コラトップ粒剤5	3kg	-	葉いもち病(白葉枯病)	6月15～20日頃に1kg、3kg/10a湛水して散布する。	
	コラトップジャンボP	50g×10パック	-		パック剤は、3cm以上湛水し散布する。藻や表層はく離が発生している水田では使用しない。コラトップジャンボPは、10～13パック/10aを投入する。	
6月中旬～7月下旬	ダブルカット粉剤3DL	-	-	葉いもち	いずれかを3kg/10a散布する。	
	ラブサイド粉剤DL	-	-			
	ビーム粉剤DL	3kg	-			
	ブラシン粉剤DL	-	-			
	ノンプラス粉剤DL	-	-			
	ラブサイドフロアブル	-	-			早期発見につとめ、発生の初期に防除する。
	ダブルカットフロアブル	-	-			
	ビームゾル	500ml	○			1,000倍(100ml/100ℓ)を10a当たり120ℓ散布する。
	ブラシンフロアブル	-	-			
	ノンプラスフロアブル	-	-			

水稲除草剤

初中期一発剤および中期剤の使用は、田植後10～25日に遅れないように散布しましょう。抵抗性アゼナ類ホタルイ等の多い地域は、中期剤との体系による防除を行いましょう。

(一発処理除草剤) 初期除草剤との体系による防除を基本とする。

時期	農薬名	規格	主な対象雑草	使用方法、使用量
田植後15日	アシュラ1キロ粒剤	1kg 10kg	ノビエ他、一年生雑草 ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヘラオモダカ、多年生雑草	ノビエ2.5葉期を目処に散布する。(田植後15日頃)。 ※ノビエ3.5葉期以上の場合は、中期剤による防除を行う。
	プライオリティ1キロ粒剤	1kg 10kg		
	ノックアウト薬粒	250g		

(中期剤・残草対策剤)

時期	農薬名	規格	主な対象雑草	使用方法、使用量
田植後15～20日	ワイドショット1キロ粒剤	1kg 10kg	ノビエ、マツバイ他一年生雑草 ホタルイ、ウリカワ ミズガヤツリ、ヘラオモダカ	粒剤は1kg/10a、ジャンボ剤は10パック/10aを投入する。
	レプラス1キロ粒剤	1kg 10kg		
田植後20～25日	レプラスジャンボ	40g×10パック		
	バيسコープ1キロ粒剤	1kg	一年生広葉雑草 ホタルイ、ウリカワ ミズガヤツリ、セリカ オモダカ	バيسコープ1キロ粒剤はイネ科雑草には効果がない。ごく浅く湛水して散布する。1kg/10a
田植後20～30日	バサグラン粒剤	3kg 9kg	ノビエ	バサグラン剤はイネ科雑草には効果がない。散布前に落水し土壌が湿っている状態で散布し、3日間入水しない。3kg/10a
	バサグラン液剤	500ml		液剤は500～700mlを水70～100ℓ/10a散布。
	ワイドパワー粒剤	3kg		ノビエ5葉期まで。1000ml/10a(水70～100ℓ)
	クリンチャーバSM液剤	500ml		ノビエ5葉期まで。100ml/10a(水100ℓ)
	ワイドアタックSC	100ml		ノビエ6葉期まで。1000ml/10a(水100ℓ)
	トドメバSM液剤	500ml		

(ノビエ残草対策)

時期	農薬名	規格	主な対象雑草	使用方法、使用量
6月下旬～7月上旬	クリンチャーEW	100ml	ノビエ	ノビエ6葉期まで。100ml/10a(水100ℓ)
	クリンチャージャンボ	50g×20パック		ノビエ4葉期まで。10a当たり30パックを投入する。少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、落水かけ流しはしない。
	クリンチャー1キロ粒剤	1kg		10a当たり1kg散布でノビエ4葉期まで。1.5kg散布でノビエ5葉期まで。
	ヒエクリーン豆つぶ250	250g		ノビエ4葉期まで。省力処理剤
	ヒエクリーン1キロ粒剤	1kg		ノビエ4葉期まで。
	トドメMF1キロ粒剤	1kg		ノビエ5葉期まで。
	トドメMF乳剤	200ml		ノビエ7葉期まで。200ml/10a(水100ℓ)

西洋なし

1. 輪紋病、胴枯病の重点防除時期です。
2. 他樹種への飛散のないように散布してください。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬	※有機殺菌剤 オキシラン水和剤	500g	-	輪紋病	500倍	450ℓ	いずれか
		1kg					
	オキシンドー水和剤80	500g	835g	-	1,200倍	450ℓ	
6月上旬・中旬	スクレアフロアブル	166ml	-	胴輪枯病	3,000倍	450ℓ	発生に応じて加用
	合成ピレスロイド スカウトフロアブル	100ml	○	輪紋病	2,000倍	600ℓ	
		500ml					
6月中旬～下旬	ネオニコ バリアード顆粒水和剤	100g	○	輪紋病	4,000倍	600ℓ	
		250g					
6月下旬～7月下旬	ダニコングフロアブル	250ml	-	ハダニ類	2,000倍	600ℓ	混用散布
	パレード15フロアブル	250ml	-	輪紋病	2,000倍	600ℓ	
	ナリアWDG	250g	-	輪黒(黒)	2,000倍	600ℓ	
	ダイアジノン水和剤34	500g	○	輪紋病	1,000倍	600ℓ	
6月下旬～7月下旬	サイアノックス水和剤	500g	-	輪紋病	1,000倍	600ℓ	
		500g					

※ナリアWDGは西洋なし(ル・レクチェ)、ぶどう(ピオーネ)に薬害が出るので飛散しないように注意する。

・本資料は防除の一例です。気象条件や作物の生育状況をふまえ、県関係機関にご相談のうえ、現場に沿った適正な防除指導をお願いいたします。
・農薬は登録内容が変更になる場合がございます。使用前に再度登録内容をご確認のうえ、ご使用いただきますようお願いいたします。



もっと近くに。

全農山形県本部 生産資材部

お問い合わせの電話番号 023-687-8700

FAX番号 023-634-8182

農薬はJAマークの製品を!

先入れ先出しの励行を!

6月の農薬

No. 3 - 2

令和6年6月1日

農薬の飛散が起こらないよう細心の注意を払いましょう。

りんご

1. 胴腐らんを発見したら患部を削りとり、ペフラン塗布剤、またはトップジンMペーストを塗布する。
2. シンクイムシ類(ハリトーシ)防除の重要な時期なので遅れないように散布しましょう。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬・中旬	バレード15フロアブル	250ml	-	褐斑点 斑落葉 病	2,000倍 50ml	700ℓ 350g	
	トレノックスフロアブル	1ℓ 2ℓ	-	すす すす 点斑 病	500倍 200ml	700ℓ 1,400ml	
	スカウトフロアブル	100ml 500ml	○	アハキ シンクイムシ類	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml	いずれかを加用
	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	シンクイムシ類	4,000倍 25g	700ℓ 175g	
	トランスフォームフロアブル	250ml	-	カイガラムシ類	2,000倍 50ml	450ℓ 150ml	
6月下旬～7月上旬	ナリアWDG	250g	-	斑黒点 斑落葉 病	2,000倍 50g	700ℓ 350g	いずれか
	ファンタジスタ顆粒水和剤	100g 166g 500g	-	すす すす 点斑 病	3,000倍 33g	700ℓ 233g	早生種に注意
	オキシンドー水和剤80	500g 835g	-	斑黒点 斑落葉 病	1,200倍 83g	700ℓ 583g	いずれか
	エクシレルSE	200ml 500ml	-	シンクイムシ類	5,000倍 20g	700ℓ 140g	
スカウトフロアブル	100ml 500ml	○	ギンモンハモグリガ	2,000倍 50g	700ℓ 350g		
6月中旬～下旬	ダニコングフロアブル	250ml	-	ハダニ類	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml	

※1 ナリアWDGは、西洋なし(ル・レクチェ)・ぶどう(ピオーネ)に薬害が出るので飛散しないように注意する。

ぶどう

1. 灰色かび防除は1回目のジベ処理後、3～4日後が適期です。
2. 2回目ジベ処理は、満開10日後頃です。遅れないように！

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考	
6月上旬	スイッチ顆粒水和剤	500g	-	灰晩色かび病	2,000倍 50g	300ℓ 150g		
	ベンコゼブフロアブル	500ml	-	べと病と腐とう	1,000倍 100ml	300ℓ 300ml	いずれか	
	スイッチ顆粒水和剤	500g	-	灰晩色かび病	2,000倍 50g	300ℓ 150g		
6月中旬	デラウエア	ジベレリン	粉末 200mg (大管1本)	2回目処理	濃度 75~100ppm 濃度 80ppm 100ppm 粉末大管200mg当り水量 2.5ℓ 2ℓ 錠剤25mg当り水量 310cc 250cc			
	デラウエア	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	チャノキイロアザミウマ	2,000倍 50g	300ℓ 150g	ヨコバイが多いときはアドマイヤー水和剤1,000倍
	デラウエア	コロマイト水和剤	100g 500g	-	ハダニ類	2,000倍 50g	300ℓ 150g	
6月中下旬	オーソサイド水和剤80	500g	-	晩腐病	800倍 125g	250ℓ 312g	デラウエア	
	ストロビードライフフロアブル	250g 500g	-	晩腐病・褐斑病	3,000倍 33g	300ℓ 100g	いずれか	
	アミスター10フロアブル	500ml	-	晩腐病・褐斑病	1,000倍 100ml	300ℓ 300ml	混用散布	
	デラウエア	ダントツ水溶剤	125g 250g	-	コガネムシ類	2,000倍 50g	300ℓ 150g	大粒種
6月下旬	コロマイト水和剤	100g 500g	-	ハダニ類	2,000倍 50g	300ℓ 150g	単用散布	

もも

1. 灰星病防除を徹底しましょう。
2. せん孔細菌病が前年多発した園では散布間隔を開けずに防除してください。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考	
6月上旬	せん孔細菌病対策	デランフロアブル	500ml	○	せん孔細菌病	600倍 167ml	400ℓ 667ml	
	ウメシロカガラムシ重点防除	サルファーゾル	1ℓ	-	黒星病	400倍 250ml	400ℓ 1ℓ	無袋
		オンリーワンフロアブル	250ml	-	灰星病・黒星病	2,000倍 50g・ml	400ℓ 200g・ml	有袋
		ナリアWDG	250g	-	灰星病	2,000倍 50g	400ℓ 200g	
6月中旬		ダイアジノン水和剤34	250g	○	カイガラムシ類	1,500倍 67g	400ℓ 268g	
	6月下旬	スコア顆粒水和剤	250g	-	灰星病	2,000倍 50g	400ℓ 200g	いずれか
		ナリアWDG	250g	-	灰星病	2,000倍 50g	400ℓ 200g	混用
		デランフロアブル	500ml	○	せん孔細菌病	600倍 167ml	400ℓ 667ml	
		ダントツ水溶剤	125g 250g	-	シンクイムシ類	2,000倍 50g	400ℓ 200g	いずれか
		エクシレルSE	200ml 500ml	-	シンクイムシ類	5,000倍 20ml	400ℓ 80ml	散布6月10日までに
	スカウトフロアブル	100ml 501ml	○	カイガラムシ類	2,000倍 50ml	400ℓ 200ml		
6月下旬	ダニコングフロアブル	250ml	-	ハダニ類	2,000倍 50ml	400ℓ 200ml		

おうとう

- ※灰星病防除を徹底しましょう。
※オウトウショウジョウバエの多い園地では散布間隔を開けずに防除しましょう。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考	
6月上旬	ナポレオン等晩生種							
		ロブラール500アクア	500ml	-	灰星病	1,500倍 67ml	700ℓ 467ml	いずれか
		バレード15フロアブル	250ml	-	灰星病	2,000倍 50g	700ℓ 350ml	混用散布
		スタークル顆粒水溶剤	250g 500g	-	カメムシ類	2,000倍 50g	700ℓ 350g	
6月中旬		ダニコングフロアブル	250ml	-	ハダニ類	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml	
	6月中旬	オンリーワンフロアブル	250ml	-	灰星病	2,000倍 50ml	500ℓ 250ml	いずれか
		ナリアWDG	250g	-	灰星病	2,000倍 50g	500ℓ 250g	
		インダーフロアブル	100ml	-	灰星病	5,000倍 20ml	500ℓ 100ml	
	6月中旬	アーデントフロアブル	250ml	-	オウトウショウジョウバエ	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml	いずれか
6月中旬	エクシレルSE	200ml 500ml	-	オウトウショウジョウバエ	2,500倍 40ml	700ℓ 280ml		

※ロブラール500アクアの連用は、果面が汚れることがあるのでいずれか1回の使用とする。

かき

- アザミウマの重点防除時期です。
落葉病の防除も重要な時期です。

散布時期	農薬名	規格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備考
6月上旬(開花直前)	テルスター水和剤	500g	-	チャノキイロアザミウマ	1,000倍 100g	500ℓ 500g	いずれか
	ジェイエース水溶剤	100g 500g	-	カキクダアザミウマ	1,500倍 67g	500ℓ 333g	混用散布
	トップジンM水和剤	250g 500g	-	カキノヘタムシガ	1,500倍 67g	500ℓ 333g	
	ベンコゼブ水和剤	500g 1kg	-	落葉病	600倍 167g	500ℓ 833g	いずれか
	アミスター10フロアブル	500ml	-	落葉病	1,000倍 100ml	500ℓ 500ml	
6月中旬	トクチオン水和剤	625g	-	チャノキイロアザミウマ	800倍 125g	500ℓ 625g	
6月下旬	上記殺菌剤			落葉病	6月上旬の上記殺菌剤参照		
	ジェイエース水溶剤	100g 500g	-	チャノキイロアザミウマ	1,500倍 67g	500ℓ 333g	