

6月の農薬

No. 3 - 1
令和7年6月1日

農薬の使用量が多くなる時期です。農薬の適正使用を徹底しましょう。

水 稲

葉いもちは発病前の予防防除が重要です。
補植用の残り苗は「葉いもち」の伝染源になるので、ただちに処分して下さい。
いもち病予防のための粒剤・パック剤は発病前に遅れないよう処理して下さい。

時期	農 薬 名	規 格	譲渡書	主な対象病害虫	使用方法、使用薬量
6月上旬～下旬	トレボン粒剤	2kg	－	イネミズゾウムシ (イネドロオイムシ) (イナゴ)	施用は湛水して行き3日間は落水しない。
	トレボン粉剤DL	3kg	－		3kg/10a ※粉剤のみフタオビコヤガ登録あり
6月中旬	オリゼメート粒剤 コラトップ粒剤5	3kg	－	葉いもち病 (白葉枯病)	6月15～20日頃に3kg/10a湛水して散布する。
	コラトップジャンボP	50g×10パック	－		パック剤は、3cm以上湛水し散布する。 藻や表層はく離が発生している水田では使用しない。 コラトップジャンボPは、10～13パック/10aを投入する。
6月中旬～7月下旬	ダブルカット粉剤3DL	3kg	－	葉いもち	いずれかを3kg/10a散布する。
	ビーム粉剤DL		－		
	ブラシン粉剤DL		－		
	ノンプラス粉剤DL		－		
	ラブサイドフロアブル	500ml	－		1,000倍（100ml/100ℓ）を10a当たり120ℓ散布する。
	ダブルカットフロアブル		－		
	ビームゾル		○		
	ブラシンフロアブル		－		
	ノンプラスフロアブル		－		

水稻除草剤

初中期一発剤および中期剤の使用は、田植後10～25日に遅れないように散布しましょう。
抵抗性アゼナ類ホタルイ等の多い地域は、中期剤との体系による防除を行いましょう。

（一発処理除草剤）初期除草剤との体系による防除を基本とする。

時期	農 薬 名	規 格	主な対象雑草	使用方法、使用薬量
田植後15日	アシュラ1キロ粒剤	1kg 10kg	ノビエ他、一年生雑草 ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヘラオモダカ、多年生雑草	ノビエ2.5葉期を目処に散布する。 (田植後15日頃)。 ※ノビエ3.5葉期以上の場合は、中期剤による防除を行う。
	ブライオリティ1キロ粒剤	1kg 10kg		
	ノックアウト薬粒	250g		

（中期剤・残草対策剤）

時期	農 薬 名	規 格	主な対象雑草	使用方法、使用薬量
田植後15～20日	ワイドショット1キロ粒剤	1kg 10kg	ノビエ、マツバイ他一年生雑草 ホタルイ、ウリカワミズガヤツリ、ヘラオモダカ	粒剤は1kg/10a、ジャンボ剤は10パック/10aを投入する。
田植後20～25日	レプラス1キロ粒剤	1kg 10kg		
	レプラスジャンボ	40g×10パック		
田植後20～30日	バイスコープ1キロ粒剤	1kg	一年生広葉雑草 ホタルイ、ウリカワミズガヤツリ、セリオモダカ	バイスコープ1キロ粒剤はイネ科雑草には効果がない。ごく浅く湛水して散布する。 1kg/10a
	バサグラン粒剤	3kg 9kg		バサグラン剤はイネ科雑草には効果がない。散布前に落水し土壌が湿っている状態で散布し、3日間入水しない。 3kg/10a
	バサグラン液剤	500ml		液剤は500～700mlを水70～100ℓ/10a散布。
	ワイドパワー粒剤	3kg		ノビエ5葉期まで。 1000ml/10a（水70～100ℓ）
	クリンチャーバスME液剤	500ml		ノビエ5葉期まで。 100ml/10a（水100ℓ）
	ワイドアタックSC	100ml		ノビエ6葉期まで。 1000ml/10a（水100ℓ）
	トメバスMF液剤	500ml	上記雑草プラスノビエ	

（ノビエ残草対策）

6月下旬～7月上旬	クリンチャーEW	100ml	ノビエ	ノビエ6葉期まで。 100ml/10a（水100ℓ）
	クリンチャージャンボ	50g×20パック		ノビエ4葉期まで。 10a当たり30パックを投入する。 少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、落水かけ流しはしない。
	クリンチャー1キロ粒剤	1kg		10a当たり、1kg散布でノビエ4葉期まで。 1.5kg散布でノビエ5葉期まで。
	ヒエクリーン豆つぶ250	250g		ノビエ4葉期まで。省力処理剤
	ヒエクリーン1キロ粒剤	1kg		ノビエ4葉期まで。
	トメMF1キロ粒剤	1kg		ノビエ5葉期まで。
	トメMF乳剤	200ml		ノビエ7葉期まで。 200ml/10a（水100ℓ）

西洋なし

- 輪紋病、胴枯病の重点防除時期です。
- 他樹種への飛散のないように散布してください。

散布時期	農 薬 名		規 格	譲渡書	主な対象病害虫	倍 数 水100ℓ 当り薬量	10a当り 散 布 量	備 考	
6月上旬	※有機殺菌剤	オキシラン水和剤	500g 1kg 1.67kg	－	輪 紋 病	500倍 200g	450ℓ 900g	い ず れ か に パ イ ノ カ を 加 用 す る	い ず れ か
		オキシンドー水和剤80	500g 835g	－		1,200倍 83g	450ℓ 375g		
		スクレアフロアブル	166ml 250ml	－	胴輪 枯紋 病病	3,000倍 33ml	450ℓ 150ml		
6月上・中旬	バイカルティまたは クレフノン加用 ※有機殺菌剤				輪 紋 病				
	合成ピレスロイド	スカウトフロアブル	100ml 500ml	○	シンクイムシ類 アブラムシ類 カメムシ類	2,000倍 50ml	600ℓ 300ml	い ず れ か	
	ネオニコ	バリアード顆粒水和剤	100g 250g	○		4,000倍 25g	600ℓ 150ml		
6月中 ～下旬	ダニコングフロアブル		250ml	－	ハ ダ ニ 類	2,000倍 50ml	600ℓ 300ml	発生に応じて 加用	
6月下旬 ～7月下旬	パレード15フロアブル		250ml		輪 紋 斑 病 黒（黒 斑星 病）	2,000倍 50ml	600ℓ 300ml	い ず れ か	混 用 散 布
	ナリアWDG		250g	－		2,000倍 50g	600ℓ 300g		
	ダイアジノン水和剤34		500g	○	シンクイムシ類 ハマキムシ類 （アブラムシ）	1,000倍 100g	600ℓ 600g	い ず れ か	
	サイアノックス水和剤		500g	－		1,000倍 100g	600ℓ 600g		

※ナリアWDGは西洋なし(ル・レクチェ)、ぶどう(ピオーネ)に薬害が出るので飛散しないように注意する。

- 本資料は防除の一例です。気象条件や作物の生育状況をふまえ、県関係機関にご相談のうえ、現場に沿った適正な防除指導をお願いいたします。
- 農薬は登録内容が変更になる場合がございます。使用前に再度登録内容をご確認のうえ、ご使用いただきますようお願いいたします。



もっと近くに。

全農山形県本部	資材エネルギー部
お問い合わせの電話番号	023-687-8700
FAX番号	023-634-8182

農薬はJAマークの製品を！

先入れ先出しの励行を！

6月の農薬

No. 3 - 2

令和7年6月1日

農薬の飛散が起こらないよう細心の注意を払いましょう。

りんご

1. 胴腐らんを発見したら患部を削りとり、ペフラン塗布剤、またはトップジンMペーストを塗布する。
2. シンクイムシ類（ハリトーシ）防除の重要な時期なので遅れないように散布しましょう。

散布時期	農 薬 名	規 格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水100ℓ当り薬量	10a当り散布量	備 考		
6月上旬・中旬	斑点落葉病重点防除	バレード15フロアブル	250ml	－	褐斑 点 斑 落 葉 病 病	2,000倍50ml	700ℓ350g	いずれかを加用散布する	
		トレノックスフロアブル	1ℓ2ℓ	－	すす すす 点斑 病 病 病	500倍200ml	700ℓ1,400ml		
		スカウトフロアブル	100ml500ml	○	アハキンシ ブマラキムシ ホムシ シンソノシ 類ガシ	2,000倍50ml	700ℓ350ml		
		ダントツ水溶剤	125g250g	－	シンクイムシ クモゴインワムホタシンソノシ 類ガシ	4,000倍25g	700ℓ175g		
		トランスフォームフロアブル	250ml	－	カイガラムシ ワタムシ 類シ	2,000倍50ml	700ℓ350ml		
6月下旬～7月上旬		ナリアWDG	250g	－	斑 点 落星斑 葉 病 病 病 病 病 病	2,000倍50g	700ℓ350g	いずれか 早生種に薬害注意	混用散布
		ファンタジスタ顆粒水和剤	100g166g500g	－	すす すす 点斑 病 病 病 病 病 病	3,000倍33g	700ℓ233g		
		オキシンドー水和剤80	500g835g	－	斑 点 落 葉 病 病 病 病 病 病	1,200倍83g	700ℓ583g		
		エクスレルSE	200ml500ml	－	シンクイムシ ホムシ シンソノシ 類ガシ	5,000倍20g	700ℓ140g		
		スカウトフロアブル	100ml500ml	○	ギンモンハモグリガ	2,000倍50g	700ℓ350g		
6月中旬～下旬		ダニコングフロアブル	250ml	－	ハダニ 類	2,000倍50ml	700ℓ350ml		

※1 ナリアWDGは、西洋なし(ル・レクチェ)・ぶどう(ピオーネ)に薬害が出るので飛散しないように注意する。

ぶどう

1. 灰色かび防除は1回目のジベ処理後、3～4日後が適期です。
2. 2回目ジベ処理は、満開10日後頃です。遅れないように！

散布時期		農 薬 名		規 格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水 ^数 当り ^{100ℓ} の薬量	10a当り 散 布 量	備 考			
6月上旬	大粒種 デラウエア(第一回ジベ処理3日後)	スイッチ顆粒水和剤		500g	－	灰 色 か び 病 晩 腐 病	2,000倍 50g	300ℓ 150g	いずれか			
		ベンコゼブフロアブル		500ml	－	べ と と 腐 う 病 晩 黒 と 腐 う 病	1,000倍 100ml	300ℓ 300ml				
		スイッチ顆粒水和剤		500g	－	灰 色 か び 病 晩 腐 病	2,000倍 50g	300ℓ 150g				
		ジベレリン	粉 末	200mg (大管1本)	－	2 回 目 処 理	濃 度 75～100ppm					
			錠 剤	25mg (一錠)	－		濃 度		80ppm	100ppm		
					粉末大管200mg当り水量		2.5ℓ	2ℓ				
						錠剤25mg当り水量	310cc	250cc				
6月中旬	デラウエア	ダントツ水溶剤		125g 250g	－	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ コガネムシ類	2,000倍 50g	300ℓ 150g	ヨコバイが多いときはアドマイヤー水和剤1,000倍			
		コロマイト水和剤		100g 500g	－	ハ ダ ニ 類	2,000倍 50g	300ℓ 150g				
6月中下旬		オーソサイド水和剤80		500g	－	晩 腐 病	800倍 125g	250ℓ 312g	デラウエア			
		ストロビードライフフロアブル		250g 500g	－	晩 腐 病 ・ 褐 斑 病 べ と 病 ・ 黒 と う 病	3,000倍 33g	300ℓ 100g	い ず れ か	混 用 散 布	大 粒 種	
		アミスター10フロアブル		500ml	－	晩 腐 病 ・ 褐 斑 病 べ と 病 ・ 黒 と う 病	1,000倍 100ml	300ℓ 300ml				
		ダントツ水溶剤		125g 250g	－	コガネムシ類 フタテンヒメヨコバイ	2,000倍 50g	300ℓ 150g				
		コロマイト水和剤		100g 500g	－	ハ ダ ニ 類	2,000倍 50g	300ℓ 150g	単用散布			

もも

1. 灰星病防除を徹底しましょう。
2. せん孔細菌病が前年多発した園では散布間隔を開けずに防除してください。

散布時期	農 薬 名	規 格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水当り薬量 100ℓ当り	10a当り散布量	備 考	
せん孔細菌病対策 6月上旬	デランフロアブル	500ml	○	せん孔細菌病 黒星病・灰星病	600倍 167ml	400ℓ 667ml		
	サルファーゾル	1ℓ	－	黒星病	400倍 250ml	400ℓ 1ℓ	無袋	と有機用 散布剤
	オンリーワンフロアブル	250ml	－	灰星病・黒星病	2,000倍 50g・ml	400ℓ 200g・ml	有袋	
	ナリアWDG	250g	－					
	ダイアジノン水和剤34	250g	○	カイガラムシ類 (モモハモグリガ)	1,500倍 67g	400ℓ 268g		
6月中下旬	スコア顆粒水和剤	250g	－	灰星病	2,000倍 50g	400ℓ 200g	いずれか	混用
	ナリアWDG	250g	－		2,000倍 50g	400ℓ 200g		
	デランフロアブル	500ml	○		600倍 167ml	400ℓ 667ml		
	ダントツ水溶剤	125g 250g	－	シンクイムシ類 (モモハモグリガ)	2,000倍 50g	400ℓ 200g	6月上旬 ～中旬に 散布する	散布
	エクシレルSE	200ml 500ml	－		5,000倍 20ml	400ℓ 80ml		
	スカウトフロアブル	100ml 500ml	○		2,000倍 50ml	400ℓ 200ml		
	ダニコングフロアブル	250ml	－		ハダニ類	2,000倍 50ml		

おうとう

- ※灰星病防除を徹底しましょう。
- ※オウトウショウジョウバエの多い園地では散布間隔を開けずに防除しましょう。

散布時期	農 薬 名	規 格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水 ^{100ℓ} 当り薬量	10a当り散布量	備 考	
6月上旬	ナポレオン等晩生種							
	ロブラール500アクア	500ml	－	灰 星 病	1,500倍 67ml	700ℓ 466ml	い ず れ か	混 用 散 布
	バレード15フロアブル	250ml	－		2,000倍 50g	700ℓ 350ml		
	スタークル顆粒水溶剤	250g 500g	－	カメムシ類 オウトウショウジョウバエ	2,000倍 50g	700ℓ 350g		
	ダニコングフロアブル	250ml	－	ハダニ類	2,000倍 50ml	700ℓ 350ml		
6月中下旬	オンリーワンフロアブル	250ml	－	灰 星 病	2,000倍 50ml	500ℓ 250ml	い ず れ か	
	ナリアWDG	250g	－		2,000倍 50g	500ℓ 250g		
	インダーフロアブル	100ml	－		5,000倍 20ml	500ℓ 100ml		
	アーデントフロアブル	250ml	－	オウトウショウジョウバエ	2,000倍 50ml	500ℓ 250ml		
	エクスレルSE	200ml 500ml	－	オウトウショウジョウバエ	2,500倍 40ml	500ℓ 200ml		

※ロブラール500アクアの連用は、果面が汚れることがあるのでいずれか1回の使用とする。

かき

- アザミウマの重点防除時期です。
- 落葉病の防除も重要な時期です。

散布時期	農 薬 名	規 格	譲渡書	主な対象病害虫	倍水 ^{100ℓ} 当り薬量	10a当り散布量	備 考	
6月上旬 (開花直前)	テルスター水和剤	500g	—	チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ カキノヘタムシガ	1,000倍 100g	500ℓ 500g	い ず れ か	混 用 散 布
	ジェイエース水溶剤	100g 500g	—		1,500倍 67g	500ℓ 333g		
	トップジンM水和剤	250g 500g	—	落 炭 葉 そ 病 病	1,500倍 67g	500ℓ 333g	い ず れ か	
	ベンコゼブ水和剤	500g 1kg	—		600倍 167g	500ℓ 833g		
	アミスター10フロアブル	500ml	—		1,000倍 100ml	500ℓ 500ml		
6月中旬	トクチオン水和剤	625g	—	チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ フジコナカイガラムシ	800倍 125g	500ℓ 625g	6月上旬の上記殺菌剤参照	
	上 記 殺 菌 剤			落 葉 病				
6月下旬	上 記 殺 菌 剤			落 葉 病				
	ジェイエース水溶剤	100g 500g	—	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ				